

Centre de Recherche pour l'Etude et l'Observation des Conditions de Vie
Crédoc

Collection
des rapports

Février 1988

N° 34




Système d'enquêtes "Conditions de vie et aspirations des Français"

OPINIONS DES FRANCAIS SUR LES STUPEFIANTS

CONSOMMATIONS ASSOCIEES D'ALCOOL,

TABAC ET TRANQUILLISANTS

Vague de Printemps 1987



Crédoc - Collection des rapports. N°
0034 : Opinions des Fr. sur les
stupéfiants, consommations
associées d'alcool, tabac et
tranquillisations. Février 1988.

CREDOC•Bibliothèque



nce Haeusler, Didier Rosch, Françoise Facy.

CENTRE DE RECHERCHE POUR L'ÉTUDE ET L'OBSERVATION DES CONDITIONS DE VIE

LE SYSTEME D'ENQUETES SUR LES CONDITIONS DE VIE ET
ASPIRATIONS DES FRANCAIS

OPINIONS DES FRANCAIS SUR LES STUPEFIANTS
CONSOMMATIONS ASSOCIEES D'ALCOOL, TABAC ET TRANQUILLISANTS

Vague de Printemps 1987

Laurence Haeusler, Didier Rösch, Françoise Facy

Etude réalisée à la demande :

- . de la Direction Générale de la Santé

Ont participé à la réalisation de cette étude :

- . Laurence Haeusler, Chargée de recherche au CREDOC
- . Didier RÖSCH, Médecin psychiatre au service de recherche du Centre Saint-Germain-des Prés CROIX ROUGE FRANCAISE
- . Françoise Facy, Directeur de recherche à l'INSERM, Unité 302

ENQUETE "CONDITIONS DE VIE ET ASPIRATIONS DES FRANCAIS"

Equipe composée de :

- . Ludovic Lebart, Directeur Scientifique
- . Françoise Boscher, Frédéric Chateau, Catherine Duflos, Françoise Gros, Laurence Haeusler, Lucette Laurent, Philippe Pleuvret.

C R E D O C

Président : Bernard Jouvin
Directeur : Robert Rochefort

S O M M A I R E

	Pages
AVANT PROPOS	1
RESUME	3
INTRODUCTION	5
. Diffusion et diversité des usages des psychotropes ..	5
. Usages médicaux, récréatifs et toxicomaniaques	6
. Usage de psychotropes dans la population générale ...	6
. Associations de produits	7
. Ancrage sociologique et culturel des consommations ..	7
. Les données	8
. Les limites de notre investigation	8
 C H A P I T R E I - OPINIONS VIS-A-VIS DES PSYCHOTROPES ILLICITES	11
. Consensus renforcé sur le danger des psychotropes illicites	11
. Les consommateurs d'un produit en minimisent le risque	11
. Evolution des opinions chez les jeunes	12
. Evolution particulièrement nette à Paris	13
. L'augmentation du niveau d'études conduit à relativiser les dangers des divers psychotropes	14
. La question de la drogue moins dramatisée chez les cadres supérieurs et professions libérales	15
. Les hommes divorcés et concubins craignent davantage l'alcoolisme et moins la drogue	16
 C H A P I T R E II - CONSOMMATION DES PRODUITS PSYCHOTROPES LICITES	19
I - Les consommations excessives	19
II - Tranquillisants ou hypnotiques	23
III - Alcool	27
IV - Tabac	28

C H A P I T R E III - PRINCIPAUX MODES D'USAGES	35
I - Construction d'une typologie des consommations associées	35
II - Les habitudes de consommation selon l'âge et le sexe	36
III - Quelques schémas typiques d'évolution des consommations de psychotropes au cours de la vie .	40
IV - Autres caractéristiques des différents groupes d'attitude	41
V - Association tabac-tranquillisants	45
VI - Conclusion	47
ANNEXE STATISTIQUE	49

A V A N T - P R O P O S

L'objet de cette étude est double :

- 1 - Quelles sont les opinions quant au danger que représente pour la jeunesse l'usage de drogues illicites, et à quels facteurs sociologiques sont corrélées ces opinions ?
- 2 - Quels sont les produits psychotropes autorisés consommés par les Français ? Les quantités absolues consommées ont dans ce travail un intérêt secondaire et nous nous sommes surtout attachés à repérer les associations de produits les plus courantes, ainsi qu'à en identifier les consommateurs privilégiés. Cet aspect de la question n'a, à notre connaissance, jamais été étudié de manière systématique à ce jour.

Le recueil des informations s'est fait au CREDOC dans le cadre du système d'enquêtes "**Conditions de vie et aspirations des Français**", dirigé par Ludovic Lebart.

Deux enquêtes ont lieu chaque année auprès d'un échantillon représentatif de la population française de 18 ans et plus. De multiples thèmes sont abordés lors des interviews : famille, travail, loisirs, éducation, alimentation, logement ...

Cette étude présente les résultats de questions insérées dans la vague de Printemps 1987, ainsi que d'une question insérée dans la vague d'Automne 1984.

L'intérêt des résultats obtenus nous poussera à proposer une deuxième phase de travail reposant sur un questionnaire et un programme d'analyse plus détaillés.

R E S U M E

L'usage de substances susceptibles de modifier l'état psychique évolue rapidement en France ces dernières années :

. baisse de la consommation d'alcool : 20,4 litres d'alcool par adulte de 20 ans ou plus en 1973-1975, à 19,4 litres en 1982-1984 (la France occupe toujours le premier rang mondial).

. augmentation de la consommation de tabac : + 15 % en volume entre 1980 et 1986.

. croissance de la consommation de tranquillisants et hypnotiques : entre 1980 et 1986, le nombre de boîtes vendues en pharmacie est passé de 52,6 millions à 76,7 millions pour les hypnotiques et sédatifs, de 61,4 millions à 87,9 millions pour les tranquillisants (1).

L'usage toxicomaniaque de ces produits reste relativement peu fréquent. L'essentiel de la consommation se fait en quantité modérée. Mais l'abstinence complète est rare. Seulement 10 % de la population ne boivent jamais d'alcool, ne fument pas et ne prennent ni somnifère, ni tranquillisant. 17 % se cantonnent à une très faible consommation d'alcool (1 apéritif par mois, qu moins d'1/4 de litre de vin à table).

Chaque produit s'adresse principalement à des consommateurs spécifiques : femmes et surtout femmes âgées pour les tranquillisants, hommes actifs pour l'alcool, jeunes pour le tabac.

Comme on le voit, l'âge et le sexe sont les premiers critères qui différencient les consommateurs de chaque produit. Mais le statut social, l'ensemble des conditions de vie jouent également un rôle important dans l'usage des produits psychotropes.

Jusqu'à présent, ces produits ont fait l'objet d'analyse de consommations séparées. L'originalité de l'enquête du CREDOC est d'étudier les consommations simultanées. L'association la plus fréquente est celle de l'alcool et du tabac. Elle l'est d'autant plus que la consommation d'alcool est élevée. A l'inverse, les consommateurs de tranquillisants et somnifères sont souvent abstinents des autres produits. Mais chez les plus jeunes, surtout les jeunes femmes, la consommation de tranquillisants est plus forte chez les fumeurs.

L'habitude de boire de l'alcool est principalement liée à l'activité et à la profession, surtout chez les hommes, ainsi qu'aux traditions alimentaires : les personnes âgées conservent souvent l'habitude de boire du vin à table, ce que font de moins en moins les jeunes.

(1) - Source : Direction de la Pharmacie et du Médicament.

En revanche, jusqu'à 50 ans, la consommation de tabac sans alcool est plutôt un signe d'anxiété. Ces personnes, essentiellement des femmes, connaissent fréquemment des difficultés dans leur vie familiale ou professionnelle.

Comme pour le tabac et l'alcool, la consommation de tranquillisants et somnifères touche des populations aux caractéristiques sociales et démographiques marquées. La pathologie paraît insuffisante pour expliquer l'ensemble de l'usage des médicaments psychotropes, pourtant a priori prescrits par le corps médical.

Pour les tranquillisants et somnifères, comme pour le tabac et l'alcool, une connaissance approfondie des consommateurs et des facteurs susceptibles de faire varier la demande paraît nécessaire pour prévoir l'évolution du marché, et éventuellement l'influencer.

Une forte opposition aux produits illicites

L'utilisation massive des psychotropes licites contraste avec une très forte opposition de l'opinion à l'usage des produits psychotropes illicites : 73 % placent la drogue en tête des produits dangereux pour la jeunesse, loin devant l'alcool et le tabac .

Certes, la toxicité majeure des substances comme l'héroïne ou la cocaïne justifie en grande partie ces oppositions. Cela montre toutefois que l'opinion publique est plus sensible aux dangers individuels immédiats qu'aux répercussions sociales (et à plus long terme) de l'abus de produits mieux connus. L'alcoolisme reste en effet, encore de nos jours, une cause de mortalité plus fréquente que l'abus de stupéfiants.

I N T R O D U C T I O N

Diffusion et diversité des usages des psychotropes

Les médicaments psychotropes, extraits traditionnellement des végétaux (quelquefois du monde minéral et exceptionnellement jusqu'à nos jours du monde animal), mais aussi depuis une cinquantaine d'années préparés synthétiquement à partir des données de la chimie organique et de la pharmacologie, sont l'objet d'une consommation qui va croissante partout dans le monde, et en particulier dans les pays qui, comme le nôtre, sont au premier rang quant à leur développement économique.

L'une des particularités les plus saisissantes de ces substances, et que l'humanité a su de bonne heure reconnaître, est la diversité de leurs effets.

On ne saurait ignorer par ailleurs, même si l'observation se limite à un champ culturel spécifique, la variété des modes d'usage, elle aussi décrite de longue date.

On ne manquera pas d'être alors frappé par l'intrication existant entre les types d'usage et les effets obtenus.

L'exemple récent du Mandrax (Methaqualone et Diphenylhydramine) est tout à fait parlant à cet égard. Des millions de personnes ont utilisé pendant plusieurs années ce produit, sous prescription médicale, comme hypnotique ; seul ou de préférence associé à l'alcool il fut à un moment donné utilisé comme drogue et diffusé sur un marché clandestin auprès de jeunes plus ou moins marginalisés et fréquemment utilisateurs d'autres psychotropes illicites. Ce mode d'utilisation a entraîné la stricte réglementation de la diffusion du produit et l'arrêt de sa fabrication.

Usages médicaux, récréatifs et toxicomaniaques

Un même produit peut ainsi passer d'un usage médical contrôlé par la prescription à un usage récréatif, voire toxicomaniaque, favorisé par le développement d'un marché clandestin.

Les limites entre l'absorption d'une substance à des fins thérapeutiques, sa consommation récréative telle qu'elle peut se développer dans le cadre de pratiques culturelles traditionnelles ou néo-formées, et son usage toxicomaniaque, sont tout autant déterminées par des conventions sociales, explicitées ou non par la législation, que par les caractéristiques propres du produit ou de celui qui l'utilise.

Ainsi, un produit comme l'alcool éthylique, dont les règles de commercialisation extrêmement complexes organisent ces conventions, est

tout à la fois l'objet d'usages médicaux divers, d'usages récréatifs culturellement valorisés, et d'usages toxicomaniaques, dans le cas de l'alcoolisme.

Usage de psychotropes dans la population générale

Autant, et nos exemples en fournissent en partie les raisons, les notions même de toxicomanie, de produit dangereux, ou d'usage abusif, sont sujettes à polémiques, autant la définition des produits psychotropes recueille actuellement un consensus permettant de poser, dans un cadre plus large et moins envahi par l'idéologie, le problème de l'usage.

Le concept de psychotrope, substance susceptible de modifier l'état psychique, apparaît, en effet, de plus en plus, comme le point de départ privilégié d'une démarche permettant la synthèse des points de vues développés à partir des questions que soulèvent leur consommation.

Cette démarche nous est apparue d'autant plus nécessaire qu'il semble exister un grand nombre de situations intermédiaires entre l'abstinence et la toxicomanie avérée, dans lesquelles le choix de tel ou tel produit, pour déterminant qu'il soit, n'apparaît que comme un facteur, entre autres, permettant la description et la compréhension des phénomènes mis en jeu.

A ce jour, la plupart des travaux qui abordent l'usage de psychotropes limitent leur champ d'observation à certains produits ou à certains modes d'usage. C'est souvent, en effet, le thème de son étude ou son terrain qui ont amené l'auteur à circonscrire son analyse. Une enquête, par exemple, s'attachera à une meilleure connaissance du marché potentiel d'une marque de cigarette ou d'un somnifère, une autre à l'épidémiologie de l'alcoolisme dans une région donnée, une autre enfin au coût social du tabagisme.

Associations de produits

Chacun sait pourtant que les consommations des divers psychotropes ne sont pas indépendantes, et si la plupart des auteurs font régulièrement allusion à des usages associés, il n'existe pas, à notre connaissance, d'analyses quantifiées de la consommation de l'ensemble des produits psychotropes disponibles pour la population générale.

Une des raisons en est vraisemblablement la difficulté, dans le cadre de budgets réduits, de recueillir des données sur un échantillon suffisamment vaste et représentatif.

Malgré tout, devant l'éparpillement des résultats disponibles et la difficulté d'un travail de synthèse, il nous a semblé indispensable de disposer de quelques bases chiffrées permettant une analyse sociologique globale de la question posée par la consommation de psychotropes. Aussi chercherons-nous avant toute chose à mesurer l'ampleur réelle du phénomène dans sa globalité et à en analyser les aspects les plus caractéristiques.

Ancrage sociologique et culturel des consommations

Par ailleurs, comme dans les travaux menés sur les habitudes alimentaires, on peut observer en lisant les résultats des études relatives à la consommation de produits illicites, que les modes d'usage des produits psychotropes sont étroitement corrélés à une constellation de facteurs qui définissent les modes de vie et les caractéristiques socio-économiques des usagers. Nous devons donc nous efforcer de décrire les principaux d'entre eux.

Les données

L'enquête "**sur les conditions de vie des Français**", que le CREDOC effectue chaque année au printemps et à l'automne depuis 1978, a fourni l'occasion d'obtenir les données nécessaires à une approche de ces divers aspects de la question.

Ce sont ces premiers résultats que nous présenterons dans les pages qui suivent.

En 1984, une question relative aux opinions des Français vis-à-vis des psychotropes avait été insérée dans cette enquête.

La formulation était la suivante :

Quel est à votre avis, parmi les phénomènes suivants, le plus menaçant pour l'avenir des jeunes ?

- Les abus de drogue
- Les abus de toxiques divers (éther, colles, etc)
- Les abus de tranquillisants et de somnifères
- Les abus de boissons alcoolisées
- Les abus de tabac.

Cette question a de nouveau été posée dans les mêmes termes en 1987. Il est ainsi possible d'apprécier, pour les produits classés en premier et en deuxième, l'évolution de l'opinion au cours des 3 dernières années.

La consommation de psychotropes licites est appréciée par 5 questions formulées de la manière suivante :

- Buvez-vous des apéritifs ou des alcools et avec quelle fréquence ?
- Au cours des repas de tous les jours, que buvez-vous de préférence ?
- Combien en buvez-vous par repas en moyenne ?
- Combien de cigarettes fumez-vous par jour en moyenne ?
- Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pris des somnifères ou des tranquillisants ?

Ces questions ont été réparties dans le questionnaire et rattachées aux thèmes "santé" et "alimentation" afin d'éviter l'impact "dramatisant" d'une série de questions sur les psychotropes.

Les limites de notre investigation.

- Aucune question n'a été posée quant à la consommation de psychotropes illicites.

A cela deux raisons :

La première est d'ordre méthodologique. Bien qu'elle soit inconnue, l'incidence de la consommation de produits illicites est très vraisemblablement inférieure à 3 % de la population générale. Compte tenu de la taille de notre échantillon, un tel pourcentage interdit tout traitement statistique.

La deuxième est à la fois d'ordre méthodologique et déontologique. L'indiscrétion d'une question relative à un comportement délictueux est de nature à altérer la crédibilité de l'ensemble des réponses à un questionnaire dont la fiabilité repose tout entière sur la bonne volonté des volontaires qui acceptent de se soumettre à un protocole de passation relativement contraignant.

- Pas de quantification précise des consommations des autres produits.

Bien que nos résultats s'avèrent cohérents avec les chiffres généralement avancés pour la consommation des différents produits, notre objectif n'est pas ici de connaître avec précision les quantités consommées, mais plutôt d'étudier les corrélations de ces consommations entre elles et avec les caractéristiques sociologiques des usagers.

C H A P I T R E I

OPINIONS VIS-A-VIS DES PSYCHOTROPES ILLICITES

C H A P I T R E I

OPINIONS VIS-A-VIS DES PSYCHOTROPES ILLICITES

Consensus renforcé sur le danger des psychotropes illicites.

Tableau N° 1

Quel est à votre avis, parmi les phénomènes suivants, le plus menaçant pour l'avenir des jeunes ?

	1984		1987	
	1ère réponse	2ème réponse	1ère réponse	2ème réponse
.Abus de drogue	66 %	13 %	73 %	12%
.Abus de de toxiques divers (éther,colles)..	6	17	4	13
.Abus de tranquillisants et de somnifères	5	9	3	8
.Abus de boissons alcoolisées	14	40	10	45
.Abus de tabac	9	21	10	22
Total	100 %	100 %	100 %	100 %

L'idée que la drogue représente une menace grave pour la jeunesse réalise un large consensus, qui s'est encore renforcé au cours des dernières années.

L'alcool arrive en deuxième position dans la hiérarchie des dangers, devant le tabac, les tranquillisants et les divers toxiques. Ces deux derniers produits paraissent fort peu dangereux aux Français.

Les consommateurs d'un produit en minimisent le risque.

Bien que les résultats ne soient pas massivement significatifs, les opinions sont cohérentes avec les habitudes de consommation. C'est parmi les non-fumeurs qu'on trouve le plus de personnes qui craignent les

conséquences du tabagisme pour les jeunes. Le même phénomène est observé avec l'alcool et les médicaments psychotropes.

Les opinions par rapport aux drogues illicites sont indépendantes des consommations de produits licites.

Evolution des opinions chez les jeunes.

Tableau N° 2

Opinions sur la drogue en fonction de l'âge

(% des personnes pour lesquelles la drogue est le produit le plus dangereux pour les jeunes)

Age	1984		1987	
	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
18/24	57 %	58 %	65 %	72 %
24/39	60 %	62 %	71 %	75 %
40/59	68 %	67 %	71 %	73 %
65 et+	77 %	79 %	79 %	73 %

La drogue est ressentie comme d'autant plus dangereuse que l'enquêté est plus âgé.

Elle suscite plus d'inquiétude chez les femmes que chez les hommes.

Dans toutes les tranches d'âge le pourcentage de personnes plaçant la drogue en tête des produits dangereux a augmenté depuis 1984.

Toutefois cette augmentation est plus forte chez les jeunes, et particulièrement chez les jeunes femmes. On peut observer en effet, qu'en 1987, ce taux est devenu, pour les femmes, pratiquement indépendant de l'âge.

Ceci est l'un des résultats les plus spectaculaires de notre étude. Une évolution aussi rapide des opinions est en effet rarement observée en dehors d'évènements particulièrement frappants et répercutés sur une vaste échelle par les médias. Ainsi les opinions par rapport à l'utilisation de l'énergie nucléaire ont-elles été massivement affectées par l'accident de Tchernobyl.

Il nous paraît vraisemblable que les campagnes d'information menées en 1986/1987 auprès des jeunes sont au moins en partie responsables de l'évolution observée pour les opinions relatives aux stupéfiants.

La reproduction de l'enquête dans les années à venir permettra de vérifier la pérennité de ces résultats.

Evolution particulièrement nette à Paris.

Nous n'étudierons ici que l'opposition Paris / Province pour les personnes qui placent les produits illicites en tête des consommations "à risque".

Tableau N° 3

Opinion sur la drogue selon l'âge et le lieu d'habitation

(% de personnes plaçant la drogue en tête des produits dangereux)

Lieu d'habitation par rapport à l'âge	1984	1987 Hommes et femmes	1987 Hommes	1987 Femmes
Paris ... <40 ans	56	68	63	73
Paris ... >40 ans	80	75	77	74
Province. <40 ans	61	69	63	74
Province. >40 ans	71	74	74	74

C'est pour les personnes jeunes, et surtout à Paris, que la crainte de la drogue a le plus augmenté. Ce résultat est en accord avec les hypothèses explicatives formulées au paragraphe précédent.

Le fait de juger dangereuses pour les jeunes les drogues illicites est corrélé à la crainte d'être agressé dans la rue (82 % contre 64 %). Il est également lié à la crainte du chômage (79 % contre 67 % pour les femmes et 80 % contre 66 % pour les hommes).

Nous confirmons ici un phénomène général : il existe d'importantes corrélations entre l'anxiété manifestée à l'égard de diverses éventualités désagréables. Ce sont souvent les mêmes personnes qui craignent ces diverses éventualités.

Il faut toutefois souligner que les pourcentages de personnes craignant le chômage ou une agression n'ont pas augmenté depuis 1984, contrairement à celui des personnes qui redoutent les dangers des stupéfiants pour la jeunesse.

L'augmentation du niveau d'études conduit à relativiser les dangers des divers psychotropes.

Tableau N° 4

Opinion sur la drogue selon le niveau de diplômes

(% des personnes plaçant la drogue en tête des produits dangereux)

	1984	1987 Hommes et femmes	1987 Hommes	1987 Femmes
Pas de diplôme	72	78	79	78
CEP	70	75	74	77
BEPC	64	72	72	72
BAC	56	69	68	70
Supérieur	52	53	52	55

Les personnes ayant un niveau d'étude élevé semblent prendre plus volontiers en considération les dangers présentés par les autres substances psychotropes : en 1987, 17 % des personnes ayant un niveau supérieur au bac placent la drogue en second, et 14 % l'alcool en premier (contre 12 % et 10 % dans l'ensemble de la population). Elles sont moins nombreuses que les personnes peu diplômées à s'inquiéter de la drogue en premier lieu.

Par ailleurs, l'augmentation du taux d'inquiétude par rapport à la drogue semble indépendante du niveau d'études.

L'effet du niveau d'études est le même pour les deux sexes.

La question de la drogue moins dramatisée chez les cadres supérieurs et professions libérales.

Tableau N° 5

Opinion sur la drogue en fonction de la profession

(% des personnes plaçant la drogue en tête des produits dangereux)

	1984	1987 Hommes et femmes	1987 Hommes	1987 Femmes
Agriculteurs	66 %	86 %	85 %	87 %
Ouvriers	66	75	74	77
Prof. indép.	60	67	57	81
Cad.sup.prof.lib	64	57	58	50
Cadres moyens	56	70	71	66
Employés	64	75	74	75
Etudiants	49	60	56	62
Ménagères	66	74	76	74
Inactifs	77	77	77	77
TOTAL	66	73	72	74

Ce sont les cadres supérieurs et les professions libérales ou indépendantes qui, avec les étudiants, jugent le moins souvent les drogues illicites dangereuses pour les jeunes : 57 % d'entre eux placent les drogues illicites en tête, contre 73 % dans l'ensemble de la population. (49 personnes sur 87). Cette catégorie se méfie davantage des méfaits du tabac : 20 % le placent en tête contre 10 % dans l'ensemble de la population.

Les professions indépendantes mettent souvent l'alcool en tête des dangers : pour 23 % d'entre eux (contre 11 % dans l'ensemble de la population).

Ce sont les agriculteurs qui placent le plus souvent les drogues illicites en tête.

Les hommes divorcés et concubins craignent davantage l'alcoolisme et moins la drogue.

Les hommes divorcés ou vivant en concubinage sont les plus nombreux à prendre en considération les dangers de l'alcoolisme pour les jeunes (22 % et 17 % placent ces produits en tête des produits dangereux). Ils ne sont que 64 % et 66 % à placer la drogue en tête, contre 74 % pour les hommes mariés.

Pour les femmes la crainte des stupéfiants est beaucoup moins fortement corrélée à la situation matrimoniale.

Enfin, on peut observer que les hommes jugent les drogues illicites d'autant plus dangereuses qu'ils souffrent de solitude : de 68 % pour ceux qui n'en souffrent pas du tout à 79 % pour ceux qui en souffrent le plus.

Rappelons que nous décrivons seulement ici des covariations entre opinions et situations, sans supposer l'existence d'un lien causal direct.

CHAPITRE II

CONSOMMATION DES PRODUITS PSYCHOTROPES LICITES

C H A P I T R E I I

CONSOMMATION DES PRODUITS PSYCHOTROPES LICITES

I - LES CONSOMMATIONS EXCESSIVES

Des raisons éthiques (caractère clandestin de la consommation ou du trafic) autant que méthodologiques (faible pourcentage de consommateurs dans la population générale) nous ont interdit, rappelons-le, d'étudier dans cette enquête la consommation de psychotropes illicites.

Nous pouvons cependant estimer sommairement les consommations des produits licites étudiés : tabac, alcool et tranquillisants ou hypnotiques.

12 % de la population font de l'alcool ou du tabac un usage dont on peut craindre qu'il ne soit dangereux pour leur santé. Nos chiffres, malgré leur imprécision et leur probable sous-estimation, recourent les résultats observés par d'autres méthodes d'étude.

- . 2,5 % prennent l'apéritif tous les jours.
- . 1 % boit plus de deux litres de vin par jour et 5,5 % plus d'un litre.
- . 9 % fument plus de vingt cigarettes par jour.
- . 14 % prennent régulièrement des tranquillisants ou des hypnotiques

(soulignons en ce qui concerne les tranquillisants et les somnifères que la question posée ne permet de préciser ni la nature ni les quantités consommées, ce qui interdit de parler de consommation excessive à proprement parler).

Ces chiffres sont très différents pour les hommes et pour les femmes.

Les fortes consommations d'alcool et de tabac se rencontrent surtout chez les hommes :

- 4,5 % prennent l'apéritif tous les jours,
- 10 % boivent plus d'un litre de vin par jour,
- 12,5 % fument plus de vingt cigarettes par jour.

Les fortes consommations féminines concernent essentiellement les médicaments :

19 % prennent régulièrement des hypnotiques ou des tranquillisants.

Ces résultats confirment l'importance quantitative des consommations de psychotropes et laissent prévoir des conséquences sanitaires non négligeables.

Opposition entre les psychotropes prescrits et les psychotropes d'agrément.

En résumé, les principaux résultats de cette étude montrent que :

- Les consommations des divers produits psychotropes ne sont pas indépendantes les unes des autres.

- L'attitude face aux produits psychotropes est caractéristique en premier lieu du sexe et de l'âge des consommateurs. Mais elle dépend aussi de l'ensemble de leurs conditions de vie.

Tranquillisants et hypnotiques sont assez rarement associés à l'alcool ; ceci est particulièrement net chez les femmes : 45 % des femmes qui ne boivent jamais d'apéritif consomment des tranquillisants ou des hypnotiques régulièrement ou occasionnellement, contre 29 % de celles qui en boivent, même peu (Graphique 1).

On n'observe pas un usage plus important des psychotropes chez les femmes qui boivent du vin que chez celles qui boivent de l'eau. Mais si l'on prend en considération les quantités bues, les rares femmes qui boivent plus d'un litre de vin par jour sont rarement consommatrices de tranquillisants ou d'hypnotiques (graphique 2).

La proportion de personnes consommant des hypnotiques régulièrement ou occasionnellement est à peu près la même chez les personnes fumant plus de 10 cigarettes par jour et chez les abstinents (30 %). Elle est plus faible pour les petits fumeurs (23 %) (graphique 3). Cet effet s'observe aussi bien chez les femmes que chez les hommes.


Tabac et alcool sont très souvent associés :

- Plus de la moitié des hommes qui boivent l'apéritif tous les jours fument plus de dix cigarettes contre 35 % de l'ensemble de la population masculine. L'augmentation parallèle de la consommation de tabac et d'apéritifs ou d'alcools s'observe chez les femmes aussi bien que chez les hommes (graphique 4).

- Un tiers des hommes qui boivent du vin à table fument plus de dix cigarettes par jour. Chez les femmes, en revanche, le fait de boire du vin à table n'est pas lié à la consommation de tabac (graphique 5).


GRAPHIQUE 1

CONSOMMATION DE TRANQUILLISANTS ET
HYPNOTIQUES SELON LA CONSOMMATION
D'APERITIFS ET D'ALCOOLS




GRAPHIQUE 2

CONSOMMATION DE TRANQUILLISANTS ET
HYPNOTIQUES SELON LA CONSOMMATION
QUOTIDIENNE DE TABAC




GRAPHIQUE 3

CONSOMMATION DE TRANQUILLISANTS ET
HYPNOTIQUES SELON LA BOISSON
HABITUELLE AUX REPAS




GRAPHIQUE 4

CONSOMMATION DE TABAC EN FONCTION DE
LA CONSOMMATION D'APERITIFS ET D'ALCOOLS



GRAPHIQUE 5

CONSOMMATION DE TABAC EN FONCTION
DE LA QUANTITE DE VIN BUE AU REPAS



Si l'on prend en compte les quantités bues, l'augmentation du tabagisme est parallèle à celle de la consommation de vin. Ceci s'observe dans les deux sexes, mais surtout chez les hommes où 59 % de ceux qui boivent plus d'un litre de vin par jour fument plus de dix cigarettes (graphique 5).

On voit déjà ici s'esquisser une opposition entre la consommation de médicaments psychotropes, consommation au moins en partie prescrite médicalement, d'un côté, et l'usage de tabac et d'alcool, psychotropes d'agrément volontiers associés.

II - TRANQUILLISANTS OU HYPNOTIQUES

Tableau N° 6

(en %)

	Hommes	Femmes	Ensemble
Consommation régulière	9	19	14
occasionnelle	11	17	14
nulle	80	64	72
TOTAL	100	100	100

- La consommation de médicaments psychotropes est beaucoup plus forte chez les femmes que chez les hommes et commence nettement plus tôt.

- Les femmes âgées sont les principales consommatrices.


Aussi bien chez les hommes que chez les femmes, la consommation régulière de tranquillisants ou d'hypnotiques est d'autant plus fréquente que l'âge est plus élevé.

On passe ainsi de : 0 % pour les hommes de moins de 24 ans
à 34 % " femmes " plus de 60 ans


Solitude et anxiété.

La solitude et l'anxiété paraissent, comme on pouvait s'y attendre, être le lot de ces femmes âgées qui consomment régulièrement des tranquillisants ou des hypnotiques.

GRAPHIQUE 6
SOMNIFERES ET TRANQUILLISANTS
 CONSOMMATION OCCASIONNELLE OU REGULIERE
 SELON L'AGE ET LE SEXE



GRAPHIQUE 7
SOMNIFERES ET TRANQUILLISANTS
 CONSOMMATION REGULIERE
 SELON L'AGE ET LE SEXE



- 52 % souffrent de maux de tête contre 35 % chez celles qui n'en consomment jamais.
- 35 % suivent un régime alimentaire 18 % "
- 70 % souffrent de mal au dos contre 45 % "
- 78 % " nervosité " 42 % "
- 56 % " dépression " 11 % "
- 74 % " d'insomnies " 19 % "
- 39 % " de troubles digestifs 20 % "
- 42 % souffrent de la solitude contre 18 % "

A un niveau moindre, les mêmes symptômes se retrouvent chez les hommes qui prennent des tranquillisants ou des somnifères :

- 42 % souffrent de maux de tête contre 23 % chez ceux qui n'en consomment jamais.
- 52 % souffrent de mal au dos contre 36 % " "
- 66 % " de nervosité " 34 % " "
- 38 % souffrent de dépression " 6 % " "
- 51 % " d'insomnie " 11 % " "
- 34 % souffrent de troubles digestifs " 16 % " "
- 30 % suivent un régime alimentaire, " 13 % " "
- 23 % souffrent de la solitude contre 9 % " "

Chez les femmes, la consommation de tranquillisants ou d'hypnotiques est corrélée à la crainte d'être victime d'une agression dans la rue (41 % des femmes utilisant régulièrement des tranquillisants ou des hypnotiques craignent cette éventualité, contre 28 % pour celles qui n'en utilisent jamais).

Les difficultés familiales favorisent l'usage des tranquillisants chez les femmes, mais pas chez les hommes.

52 % des femmes séparées ou divorcées consomment des tranquillisants ou des hypnotiques régulièrement (26 %) ou occasionnellement (26 %).


Toujours symptomatique de tensions familiales, mais à un niveau de gravité moindre, on observe que l'existence de conflits entre la vie professionnelle et la vie privée augmente significativement la consommation occasionnelle féminine.

A l'inverse, dans la population masculine, c'est chez les hommes mariés qu'on trouve une consommation relativement fréquente de ces produits (11 %) ; elle est plus rare chez les hommes divorcés ou séparés.

Par ailleurs, chez les actifs, hommes ou femmes, la consommation de médicaments psychotropes n'est pas liée aux difficultés professionnelles, telles qu'on peut les percevoir dans l'enquête : crainte du chômage, être ou avoir été au chômage.

GRAPHIQUE 8


CONSOMMATION D'APERITIFS ET D'ALCOOLS
SELON L'AGE ET LE SEXE



— Plus d'une fois par semaine
- - - Jamais

GRAPHIQUE 9

BOIRE DU VIN AUX REPAS QUOTIDIENS
SELON L'AGE ET LE SEXE



L'ensemble de ces résultats met avant tout en évidence l'importance de la prescription de médicaments psychotropes comme mode de réponse aux difficultés existentielles du troisième âge..

III - ALCOOL

Tableau N° 7

Fréquence de la consommation d'apéritifs ou d'alcools
(en %)

	Hommes	Femmes	Ensemble
Tous les jours	5	1	3
Plusieurs par sem	17	5	11
Une fois/semaine	30	18	24
Une fois/mois	29	35	32
Jamais	19	40	30
Total	100	100	100

Tableau N° 8

Boissons habituelles aux repas
(en %)

	Hommes	Femmes	Ensemble
Vin	40	14	26
Eau	52	79	66
Autre	8	7	8
Total	100	100	100

Des usages surtout masculins.

Dans l'ensemble la consommation d'alcool est, on le sait, plus élevée pour les hommes que pour les femmes.

En outre la consommation importante d'alcool semble un peu plus fréquente lorsqu'il s'agit d'hommes séparés ou divorcés.

Pour les usages modérés, on peut opposer les consommations de vin d'une part, d'apéritifs et d'alcools, d'autre part.

Pour les deux sexes, alors que la consommation de vin à table augmente avec l'âge, la consommation d'apéritifs ou d'alcools diminue (graphiques 8 et 9).

Si la consommation de vin est généralisée à toutes les catégories sociales, celle d'apéritifs ou d'alcools est plus fréquente dans les couches aisées disposant d'un bon niveau d'instruction.

En ce qui concerne la consommation masculine, outre l'opposition apéritifs et alcools/vin, on peut observer des différences significatives entre les enquêtés suivant les quantités de vin régulièrement consommées.

L'usage de boire du vin au repas est un peu plus fréquent en milieu rural et dans les grandes agglomérations ; mais s'il s'agit ordinairement d'une consommation modérée à la campagne ; celle-ci paraît souvent plus importante en ville.

C'est en effet chez les ouvriers et les employés qu'on trouve le plus fort pourcentage de personnes consommant plus d'un litre de vin par jour.

Dans l'ensemble, l'usage de boissons alcoolisées et le type de boisson utilisé sont étroitement liés au mode de vie dans ses dimensions familiales et professionnelles ainsi qu'aux habitudes alimentaires qui en dépendent.

IV - TABAC

Tableau N° 8

Consommation quotidienne de cigarettes

(en %)

	Hommes	Femmes	Ensemble
plus de 20	13	6	9
10 à 20	21	12	17
1 à 10	11	10	10
Ne sait pas	55	72	64
Total	100	100	100

- Le tabagisme reste majoritairement un comportement masculin.

- Il est très net que c'est chez les ouvriers des deux sexes que le tabagisme est le plus répandu (40 % fument plus de 10 cigarettes, contre 26 % de l'ensemble de la population ; 18 % des ouvriers de sexe masculin fument plus de 20 cigarettes par jour).

Les non-fumeurs se trouvent parmi les ménagères et les retraités (72 % et 83 %), mais également parmi les agriculteurs (78 %, contre 64 % dans l'ensemble de la population).

Surtout pour les hommes, la consommation de tabac croît avec la taille de l'agglomération de résidence. On trouve les non-fumeurs en milieu rural et les gros fumeurs dans les petites villes ou à Paris.

Les jeunes, surtout les jeunes femmes, fument davantage que leurs aînés.

L'âge influe sur la consommation de tabac de manière différente chez les femmes et chez les hommes.


Celle-ci est d'autant plus répandue que les femmes sont plus jeunes. Elle semble également diminuer en quantité avec l'âge.

Environ une femme sur deux fait usage de tabac avant 40 ans; 25 % fument 10 à 20 cigarettes par jour, 10 % plus de 20 et 15 % moins de 10. Après 40 ans 85 % des femmes ne fument pas.

Chez les hommes, la consommation de tabac est maximum entre 25 et 40 ans. 20 % de cette classe d'âge fument plus de 20 cigarettes par jour ; la consommation diminue par la suite (71 % des hommes de plus de 60 ans sont non-fumeurs).

GRAPHIQUE 10

CONSOMMATION QUOTIDIENNE DE TABAC SELON L'ÂGE ET LE SEXE



Forte influence du statut matrimonial

Tableau N° 9

Pourcentage de fumeurs selon le statut matrimonial et le sexe

Célibataires		Concubins		Mariés		Divorcés		Veufs	
Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
49	45	66	61	40	23	60	46	34	5

La consommation de tabac est fortement influencée par le statut matrimonial. Curieusement, les personnes, hommes ou femmes vivant en concubinage, sont les plus nombreuses à faire usage de tabac, loin devant les célibataires qui appartiennent pourtant à des tranches d'âge assez comparables. Le divorce semble également favoriser la consommation de tabac. Ce sont les gens mariés, ceux qui ont la situation familiale la plus stable, qui fument le moins.

Le tabagisme des femmes actives

Il apparaît que les femmes seront d'autant plus volontiers tabagiques, qu'elles sont engagées dans une activité professionnelle (23 % des femmes inactives sont fumeuses, 36 % de celles qui exercent une activité professionnelle), surtout lorsque celle-ci est source de plus de difficultés que de satisfactions.

En effet, parmi les femmes actives :

- La consommation de tabac passe à 64 % pour celles qui ont connu une période de chômage dans l'année de l'enquête.

- Le tabagisme touche 45 % des femmes qui connaissent des conflits entre vie professionnelle et vie privée, contre 30 % des autres femmes actives.

- La consommation de tabac est également plus fréquente chez les femmes qui craignent le chômage (30 % contre 20 % pour celles qui ne le craignent pas).

- Ce sont les ouvrières et les employées parmi lesquelles on trouve le plus de femmes fumant plus de 20 cigarettes par jour (plus de 10 %). Les femmes cadres et professions libérales fument souvent mais rarement plus de 10 cigarettes par jour.

Dans la population masculine en revanche, il faut noter que pour les hommes on n'observe aucune corrélation entre le tabagisme et le chômage ; la corrélation est faible avec les conflits entre vie

professionnelle et vie privée.

C'est chez les retraités et les agriculteurs qu'on trouve les taux les plus importants de non-fumeurs (plus de 70 %), mais ceux-ci sont également nombreux parmi les cadres supérieurs et les professions libérales ou indépendantes (entre 60 et 70 %).

Le tabagisme est-il un indicateur d'anxiété ?

Parmi les hommes qui fument plus de 20 cigarettes par jour :

34 %	ont des maux de tête	contre	21 %	chez ceux qui fument moins de 10
53 %	souffrent de nervosité	"	26 %	"
13 %	"	dépression	"	9 %
27 %	"	insomnie	"	12 %
13 %	"	solitude	"	7 %

Chez les femmes, les seuls symptômes que l'on retrouve davantage chez les fumeuses que chez les autres sont la nervosité et dans une moindre mesure, les maux de tête.

Parmi les fumeuses :

45 %	ont des maux de tête	contre	32 %	de celles qui ne fument pas
62 %	souffrent de nervosité	"	51 %	"
25 %	"	dépression	"	24 %
32 %	"	insomnie	"	37 %
24 %	"	solitude	"	23 %

Au total, la consommation importante de tabac apparaît souvent comme un indice d'anxiété liée, en particulier, à des difficultés affectives ou professionnelles.

C H A P I T R E I I I

PRINCIPAUX MODES D'USAGES

C H A P I T R E I I I

P R I N C I P A U X M O D E S D ' U S A G E S

I - C O N S T R U C T I O N D ' U N E T Y P O L O G I E D E S C O N S O M M A T I O N S A S S O C I E E S

Y-a-t-il complémentarité ou substitution entre ces différents produits ? Au cours du cycle de vie, passe-t-on généralement de l'un à l'autre, ou choisit-on très tôt celui qui vous convient le mieux. Existe-t-il des personnes qui n'en utiliseront jamais, ou chacun est-il amené à faire appel à ces aides à un moment de sa vie ? Telles sont les questions auxquelles nous allons tenter de répondre ou d'apporter des éléments de réponse.

Deux résultats sont très clairs: la complémentarité fréquente de l'alcool et des cigarettes, et inversement l'opposition de ces deux produits avec les tranquillisants. Ce sont essentiellement des consommateurs différents. Les habitudes de consommation de psychotropes sont très différentes selon le sexe: schématiquement, on pourrait dire aux hommes l'alcool, aux femmes les tranquillisants. De plus ces habitudes évoluent rapidement avec l'âge, et de manière différente pour chaque sexe. Si grossièrement l'usage de l'alcool et du tabac diminue avec l'âge, cela est beaucoup plus rapide dans la population féminine. Inversement, leur consommation de produits médicamenteux apparaît très tôt, vers 35-40 ans, alors que cette habitude ne se répand de façon significative dans la population masculine qu'à partir de la soixantaine.

Pour étudier les associations de consommations de psychotropes, nous avons construit une variable synthétique, en nous appuyant sur les résultats d'une analyse des correspondances. La segmentation de la population y a été faite au départ à partir de la consommation d'alcool, en définissant trois niveaux :

- consommation faible ou nulle: moins d'un quart de litre de vin par repas, et moins d'un apéritif ou alcool par semaine.

- consommation modérée: un quart de litre de vin par repas, et/ou un apéritif ou alcool par semaine.

- consommation forte: plus d'un apéritif ou alcool par semaine ou plus d'un quart de litre de vin par repas.

A l'intérieur de chacune de ces catégories, on scindera la population selon la consommation ou non de tranquillisants et/ou de cigarettes.

On obtient ainsi 8 types de consommation de psychotropes:

- Aucune (ou très faible d'alcool et de vin)	27.3%
- Tranquillisants seuls	14.1%
- Cigarettes sans alcool	15.4%
Plus tranquillisants	(4,3%)
- Alcool modéré sans cigarette	15.9%
Plus tranquillisants	(3,8%)
- Alcool modéré avec cigarettes	10.4%
Plus tranquillisants	(2,3%)
- Alcool important seul	5.2%
- Alcool important avec cigarettes sans tranquillisant	7.9%
- Alcool important avec tranquillisants	3.4%

II - LES HABITUDES DE CONSOMMATION SELON L'AGE ET LE SEXE

Une population à majorité féminine ne consomme aucun psychotrope au sens large

La sous-population qui ne consomme aucun psychotrope licite, sauf du vin en très petite quantité, représente 27% de la population globale. Les femmes sont plus nombreuses que les hommes à avoir cette attitude (34% des femmes contre 19% des hommes). La population des personnes "abstinentes" est pratiquement stable selon les âges. Elle décroît cependant chez les hommes au début de la vie active, de 29% pour les moins de 25 ans à 14% pour la tranche d'âge 25-34 ans et se stabilise ensuite autour de 20%. Comme inversement pour les hommes, l'approche de la trentaine est la période où la forte consommation d'alcool est la plus fréquente, il semble bien qu'il y ait abandon provisoire d'une attitude d'abstinence au profit de la consommation d'alcool, qui diminue très fortement ensuite.

Il est impossible, à partir de cette seule enquête d'affirmer si la non-consommation de psychotropes est une attitude stable pratiquement tout au long du cycle de vie, ou si au contraire, cette apparente stabilité dissimule de nombreux transferts. Toutefois, cette forte stabilité des chiffres selon l'âge, ainsi que d'autres caractéristiques de cette population que nous présenterons plus loin inciteraient plutôt à préférer la première hypothèse. Ce qui voudrait dire qu'un peu plus d'un quart de la population, majoritairement féminine, ne ressentirait nul besoin d'utilisation de psychotropes tout au long de sa vie.

La consommation de cigarettes sans alcool : surtout les jeunes

L'habitude de fumer, quand elle n'est pas accompagnée de consommation d'alcool, diminue rapidement avec l'âge. Chez les moins de 35 ans, cette attitude est beaucoup plus courante chez les femmes que chez

les hommes. Rappelons qu'il s'agit ici de la consommation de cigarettes seules. Globalement, les hommes fument davantage que les femmes, mais ils le font plus souvent conjointement avec la consommation d'alcool. La consommation de cigarettes décroît encore plus rapidement avec l'âge chez les femmes que chez les hommes. Il s'agit sans doute d'un double effet: celui de l'âge, et celui de génération, les jeunes femmes fumant davantage que leurs aînées ne le faisaient.

Tranquillisants seuls: près d'une femme âgée sur deux y a recours

La consommation de tranquillisants ou de somnifères, à l'exclusion de tout autre psychotrope non médicamenteux, est beaucoup plus fréquente chez les femmes que chez les hommes. Si, pour les deux sexes elle augmente avec l'âge, cette habitude apparaît beaucoup plus tôt chez les femmes que les hommes; à partir de 35-40 ans elle ne cesse d'augmenter fortement chez les premières, alors que les hommes ne semblent en ressentir le besoin qu'à partir de la soixantaine. A partir de 65 ans, 42% des femmes ont recours à des somnifères ou tranquillisants, contre 22% des hommes. Même s'il ne s'agit ici que de la seule consommation de tranquillisants, elle reflète fidèlement l'attitude vis-à-vis des tranquillisants de l'ensemble de la population.

Les forts consommateurs d'alcool presque exclusivement des hommes dont la plupart sont des fumeurs

Ce sont dans leur large majorité des hommes, à tous les âges de la vie. Très peu de femmes ont une consommation élevée d'alcool, moins de 8%, contre 26% chez les hommes.

Dans la tranche d'âge 25-50 ans, la grande majorité des hommes fort consommateurs d'alcool sont également des fumeurs. A partir de 50 ans, on trouve à peu près autant de fumeurs que de non-fumeurs.


L'association alcool-cigarettes, rare chez les moins de 25 ans, est la plus fréquente dans les tranches d'âge 25-49 ans où elle atteint près d'un cinquième de la population masculine, pour diminuer ensuite à 10% de cette même population.

La forte consommation d'alcool, sans fumer, touche une faible partie de la population, environ 8% des hommes. Cette proportion varie peu selon l'âge: 5% pour les moins de 25 ans, 11% de 25 à 34 ans, 7% ensuite.


L'association alcool-tranquillisants est rare également, et concerne surtout des hommes. Cette habitude semble apparaître vers la trentaine, et concerne au même titre l'ensemble des tranches d'âge suivantes.

ASSOCIATIONS DE CONSOMMATIONS SELON L'AGE ET LE SEXE


GRAPHIQUE 11
Aucun psychotrope




GRAPHIQUE 12
Tranquillisants seuls



GRAPHIQUE 13
Cigarettes sans alcool




GRAPHIQUE 14
Consommation modérée d'alcool
avec cigarettes




GRAPHIQUE 15

Consommation modérée d'alcool
sans cigarette




GRAPHIQUE 16

Forte consommation d'alcool
avec cigarettes




GRAPHIQUE 17

Forte consommation d'alcool
sans cigarette



GRAPHIQUE 18

Forte consommation d'alcool
avec tranquillisants



Les personnes âgées conservent l'habitude du vin à table et fument rarement

Parmi les personnes qui consomment de l'alcool modérément sont comptabilisées celles qui boivent un quart de litre de vin par repas. Or, cette habitude alimentaire est beaucoup plus fréquente chez les personnes âgées et à la campagne, ce qui explique en partie l'évolution de la courbe "alcool modéré sans cigarette" en fonction de l'âge, pour les hommes comme pour les femmes.

Pour les hommes, la fréquence croissante en fonction de l'âge jusqu'au pic dans la tranche d'âge 50-64 ans, s'explique par la conjonction de deux phénomènes: l'abandon progressif des cigarettes et/ou la diminution de la consommation d'alcool, d'une part; l'habitude de boire une quantité modérée de vin à table qui est conservée par beaucoup de personnes âgées surtout à la campagne, d'autre part.

Pour les femmes, il s'agit essentiellement d'habitudes différentes suivant les générations. Les plus âgées boivent plus de vin à table que leurs cadettes et conservent cette habitude pour une partie non négligeable d'entre elles (15%). Comme peu de femmes appartenaient à la catégorie de personnes ayant une forte consommation d'alcool, l'effet de changement de comportement est beaucoup moins important, même si certaines peuvent arrêter de fumer en conservant une consommation d'alcool modérée.

La courbe représentant l'association "alcool modéré-cigarettes", en fonction de l'âge, montre l'abandon rapide de cette attitude chez les femmes, parce qu'elles arrêtent de fumer, et/ou consomment moins d'alcool, très rapidement, dès la quarantaine. Chez les hommes, le même changement d'habitude n'est observé qu'à partir de 65 ans.

Il faut souligner qu'on n'observe pas d'effet de substitution évident entre alcool et tranquillisants puisque parmi les personnes âgées, le fait de boire un peu ne diminue pas la consommation de tranquillisants.

III - QUELQUES SCHEMAS TYPIQUES D'EVOLUTION DES CONSOMMATIONS DE PSYCHOTROPES AU COURS DE LA VIE

Les résultats précédents suggèrent quelques styles d'évolution de la consommation de psychotropes au cours de la vie. Celles-ci diffèrent de façon importante entre les hommes et les femmes. Les schémas ci-dessous ne sont évidemment que des hypothèses de comportement modal, que cette enquête ne permet pas de vérifier.

FEMMES

Schéma 1: Aucune consommation de psychotropes tout au long de la vie (au moins de ceux étudiés ici), si ce n'est une consommation très faible d'alcool.

Schéma 2: Fume à moins de 25 ans, et consomme très peu ou pas du tout d'alcool, puis diminue très vite la consommation de cigarettes et

d'alcool, commence à utiliser des somnifères et des tranquillisants vers 30 ou 40 ans.

HOMMES

Schéma 1: Aucune consommation de psychotropes vers 25 ans, puis consomme de l'alcool et/ou fume au début de la vie active, entre 25 et 35 ans, et s'arrête complètement à partir de 40 ans.

Schéma 2: A moins de 25 ans, fume mais boit peu ou pas du tout, puis boit davantage entre 25 et 50 ans, diminue la consommation d'alcool et s'arrête progressivement de fumer. A 65 ans, il ne fume plus du tout, ne boit que modérément ou pas du tout, et commence parfois à prendre des tranquillisants.

IV - AUTRES CARACTERISTIQUES DES DIFFERENTS GROUPES D'ATTITUDE

Nous n'avons étudié ici que les différences d'attitude selon l'âge et le sexe, qui apparaissent comme les éléments explicatifs les plus importants. Cependant d'autres différences de caractères social, économique ou psychologique sont à considérer également.

Plus d'"abstinence" chez les personnes travaillant à temps partiel

On a vu que la population qui ne consomme aucun psychotrope est majoritairement féminine. Mais l'activité de la femme n'est pas en cause puisque cette attitude est aussi répandue chez les actives que chez les inactives. Toutefois celles qui n'exercent qu'une activité à temps partiel sont plus nombreuses que les autres à ne pas utiliser des psychotropes (41% contre 34% pour l'ensemble des femmes).

Une autre particularité de la population "abstinente" est de moins souffrir de symptômes de petite morbidité tels que la nervosité, les insomnies, l'état dépressif, le mal au dos que l'ensemble de la population.

En matière d'alimentation, ce sont des personnes qui, sans faire plus de régimes que les autres, se méfient toutefois davantage des corps gras: 25% les évitent car c'est mauvais pour la santé, contre 19% pour l'ensemble de la population.

Ce sont également des personnes qui sont attachées à un système de valeur traditionnelle. Elles accordent plus d'importance que les autres à la religion (notée en moyenne 3.9 sur 7 contre 3.4 dans l'ensemble), mais également à la famille, la leur et la famille proche, ainsi qu'au travail. Pour elles, le mariage est souvent une "union indissoluble".

Tranquillisants seuls: solitude et mauvaise santé

Les caractéristiques de la population qui n'utilisent que des médicaments psychotropes reflètent évidemment la forte proportion de femmes âgées que l'on y trouve. Deux éléments sont en tout état de cause surdéterminants : l'état de santé et la solitude.

On retrouve bien entendu les symptômes liés à la prise de tranquillisants: 66% ont souffert d'insomnies récemment, 46% d'état dépressif, 70% de nervosité. Mais d'autres symptômes de petite morbidité apparaissent également: mal au dos (75%), maux de tête (46%), troubles digestifs (34%). Globalement, leur état de santé, par rapport à celui des personnes de leur âge, leur apparaît peu ou pas du tout satisfaisant (35% contre 16% dans l'ensemble de la population).

De plus, beaucoup ont un sentiment de solitude. 59% sont d'accord avec l'affirmation "des gens comme moi se sentent souvent seuls et coupés du monde", contre 38% en moyenne.

Ceci n'est pas seulement lié à l'âge des personnes concernées. A l'intérieur d'une même classe d'âge féminine (les moins de 60 ans), les sentiments de solitude comme de mauvaise santé sont plus fréquents dans la population qui fait usage de médicaments psychotropes.

Tableau N° 10

Indicateurs de petite morbidité et solitude chez les femmes de plus de 60 ans

(selon la consommation de médicaments psychotropes)

en %

	usage de médicaments	ne consomment aucun psychotrope
Les gens comme moi se sentent souvent seuls et coupés des autres	72,0	49,9
Maux de tête *	40.7	30.2
Mal au dos *	70.9	50.5
Nervosité *	65.7	30.0
Etat dépressif *	43.3	18.1
Insomnies *	71.4	28.6
Peu satisfait de son état de santé	35,3	18,5
Suit un régime alimentaire	41.1	25.9
Effectifs	115	96

* au cours des quatre dernières semaines.

Tranquillisants et alcool: beaucoup de cadres moyens, d'artisans et de commerçants

Moins de 4% de la population utilisent les tranquillisants conjointement avec une forte consommation d'alcool. Ce sont surtout des hommes, mais cette attitude concerne l'ensemble des classes d'âge. Malgré les faibles effectifs dont nous disposons, il semblerait que cette attitude soit particulièrement fréquente dans les professions intermédiaires, et chez les artisans et commerçants (resp. 8% et 9% d'entre eux, contre 4% en moyenne).

La petite morbidité déclarée telle que : insomnie, nervosité, état dépressif, est fréquente dans cette population, moins toutefois que chez ceux qui ne prennent que des tranquillisants.

Cigarettes sans alcool : des jeunes avec des problèmes de logement ou de travail

La population qui fume sans boire d'alcool est majoritairement une population jeune, avec 70% de moins de 40 ans, contre 47% en moyenne, et surtout de femmes jeunes. Les autres caractéristiques de cette population sont en partie liées à cette répartition démographique.

En particulier, il s'agit majoritairement de personnes qui ont de jeunes enfants (54% ont des enfants de moins de 16 ans, contre 40% en moyenne). On trouve également une nette sur-représentation des familles nombreuses: 25% des personnes appartiennent à un foyer de 5 personnes ou plus, contre 15% dans l'ensemble.

Même s'il s'agit de personnes jeunes, l'habitude de fumer sans boire est plus courante chez les concubins (32%) que chez les célibataires (21%).

D'autre part, l'habitat est assez caractéristique: 38% vivent en banlieue contre 30% en moyenne. Pour les moins de 40 ans, cette attitude est plus répandue chez les parisiens que chez les provinciaux: 31% des premiers, contre 21% des seconds.

On trouve dans cette population des signes d'insatisfaction ou de frustration: insatisfaction notamment vis-à-vis de leur logement (23% d'entre eux contre 13% en moyenne), de leur cadre de vie quotidien. D'ailleurs, 37% envisagent de changer de logement, contre 27% en moyenne. Ils ressentent fortement les contraintes de revenu, sans toutefois avoir des revenus plus faibles que la moyenne, ainsi que les contraintes de temps. 70% s'imposent régulièrement des restrictions (60% en moyenne), mais pas sur des produits de première nécessité: vacances, habillement, tabac et boisson, équipement ménager, soins de beauté, mais pas sur les soins médicaux ou les dépenses pour les enfants.

Beaucoup souffrent de nervosité (55%, contre 47% en moyenne).

Enfin, c'est une population dans laquelle les problèmes de chômage se posent fréquemment. 23% d'entre eux ont au moins un chômeur dans leur foyer, contre 14% en moyenne. 15% recherchent en ce moment un emploi régulier, contre 10% en moyenne.

La catégorie socio-professionnelle dans laquelle l'habitude de fumer sans boire est la plus répandue est celle des employés (27% d'entre eux). Ceci est due en grande partie à la forte féminisation de cette profession, mais pas uniquement, car seulement 22% des femmes actives partagent cette habitude.

Alcool et cigarettes: des ouvriers, des chômeurs, mais aussi des cadres supérieurs

La moitié de la population qui a une forte consommation d'alcool fume en même temps, sans utiliser de médicaments psychotropes. C'est une population à 83% masculine, et dont plus de la moitié se situe dans la tranche d'âge 25-50 ans, c'est-à-dire dans la tranche d'âge la plus active.

Les ouvriers sont particulièrement nombreux à avoir cette pratique (16% d'entre eux, contre 8% dans l'ensemble de la population). De manière générale, c'est d'ailleurs parmi eux que l'on trouve le plus de fumeurs. Mais l'habitude d'associer l'alcool et cigarettes est également répandue parmi les cadres supérieurs, même si la faible proportion de ceux-ci limite la portée de ce résultat. On remarque également que cette habitude est particulièrement répandue dans le secteur privé.

- Parmi les forts consommateurs de boissons alcoolisées, on trouvera d'une part une population qui se soucie peu de l'incidence de l'alimentation sur sa santé, et fait peu de régimes (90% d'entre eux, contre 81% en moyenne). Pour elle, une bonne alimentation est avant tout savoureuse (29% contre 15%). En somme, des bons vivants, qui souffrent rarement de dépression (9% d'état dépressif, contre 18% en moyenne).

- d'autre part, une population pour laquelle on peut supposer, en revanche, qu'il ne s'agit pas de "bien vivre" : celle des personnes qui ont été au chômage au cours des 12 derniers mois. 16% d'entre elles associent effectivement alcool à haute dose et cigarettes. Ceci remet évidemment en cause le tableau idyllique qui pourrait se dégager du paragraphe précédent.

Alcool sans cigarette: plutôt à la campagne

La forte consommation d'alcool, associée avec aucun autre produit psychotrope, est également une habitude masculine, plutôt dans les tranches d'âge actives. Contrairement à la population qui associait alcool et cigarettes, on trouve ici moins de chômeurs que dans l'ensemble de l'échantillon. Enfin, les personnes habitant les petites agglomérations y sont nettement sur-représentées (40% dans des agglomérations de moins de 2000 habitants, contre 27% dans l'ensemble).


Parmi les personnes dont la consommation d'alcool reste plus modérée, cette opposition est encore plus nette: ceux qui ne fument pas vivent plutôt dans les petites agglomérations, à la campagne, alors que les fumeurs se rencontrent davantage chez les ouvriers, et parmi les salariés du secteur privé.

V - ASSOCIATION TABAC-TRANQUILLISANTS

La typologie présentée précédemment mettait essentiellement en évidence l'association la plus fréquente : tabac et alcool. Mais une autre association mérite d'être étudiée : celle du tabac et des tranquillisants. Par beaucoup d'aspects, les personnes qui fument et prennent des médicaments psychotropes, occasionnellement ou régulièrement, ressemblent à la population des "fumeurs sans alcool", dont un quart consomme des tranquillisants ou somnifères.

GRAPHIQUE 19

ASSOCIATION TABAC-TRANQUILLISANTS SELON L'AGE ET LE SEXE



Chez les jeunes femmes ...

Si sur l'ensemble de la population, les fumeurs consomment moins de médicaments psychotropes que les non-fumeurs (24 % contre 30 %); il en va différemment chez les plus jeunes. Parmi les moins de 50 ans, 30 % des fumeurs prennent des tranquillisants contre 19 % des non-fumeurs. La complémentarité du tabac et des tranquillisants apparaît chez les hommes comme chez les femmes, mais elle est beaucoup plus nette chez ces dernières, surtout quand elles sont jeunes ; 28 % des fumeuses de moins de 35 ans prennent des somnifères et des tranquillisants, contre 15 % des non-fumeuses.

L'association tabac-tranquillisants ou somnifères, qui touche 9 % des Français, se fait donc chez une population relativement jeune (moyenne d'âge 39 ans, contre 44 ans en moyenne), plutôt féminine, qui affiche des symptômes de petite morbidité qui ont justifié la prescription de

médicaments : nervosité (75 % d'entre elles, contre 47 % en moyenne), insomnies (51 % d'entre elles, contre 27 % en moyenne), état dépressif (37% d'entre elles, contre 17 % en moyenne).

...Et les personnes qui rencontrent des difficultés dans leur vie quotidienne

Ce sont souvent des personnes qui rencontrent des difficultés soit dans leur vie professionnelle (17 % des chômeurs associent médicaments et tabac, 16 % des personnes qui ont un chômeur dans leur foyer, contre 9% en moyenne), soit dans leur vie privée (18 % des divorcés). La solitude est également une caractéristique de ces personnes : 30 % sont tout à fait d'accord avec l'assertion "les gens comme moi se sentent souvent seuls et coupés des autres", contre 17 % en moyenne.

Le "régime" tranquillisants + tabac est souvent adopté par les ménagères (15 % d'entre elles, contre 9 % en moyenne).

Insatisfaction et frustration apparaissent à travers de nombreuses opinions :

- . peu satisfaits de leur alimentation (14 % contre 6% en moyenne) ;
- . pas satisfaits de leur logement (25 % contre, 13 % en moyenne)
D'ailleurs, 42 % envisagent de changer de logement, contre 27 % en moyenne. Il faut noter que 40 % vivent dans la banlieue d'une ville, contre 30 % en moyenne ;
- . en ce qui concerne le niveau de vie personnel, "ça va beaucoup moins bien" qu'il y a 10 ans (28 % contre 18 % en moyenne) ;
- . restrictions sur les vacances (55 % contre 43 %), l'habillement (53% contre 42 %).

Les personnes qui associent "tabac et tranquillisants" se montrent "beaucoup inquiètes" de l'éventualité d'une agression dans la rue (41 % contre 26 % en moyenne), ce qui est à rapprocher d'une part de l'ensemble des signes d'insatisfaction, mais aussi de l'habitat, qui se situe fréquemment en banlieue.

A ces personnes mécontentes de leur présent et de leur passé, souvent pour des motifs bien compréhensibles, l'avenir paraît également incertain, même si elles ne sont pas particulièrement pessimistes :

- . 22 % sont tout à fait d'accord pour dire qu'aujourd'hui une personne doit vivre au jour le jour (contre 12 % en moyenne) ;
- . 49 % ne mettent jamais d'argent de côté, contre 37 % en moyenne.

Enfin, comme pour l'ensemble des fumeurs en général, on remarque une forte sur-représentation des concubins : 16 % d'entre eux allient l'alcool

et tranquillisants (contre 9 % en moyenne).

VI - CONCLUSION

L'opposition entre produits prescrits et produits d'agrément apparaît clairement à travers les caractéristiques des usagers.

Le poids des traditions, l'environnement social sont des facteurs déterminants de la consommation d'alcool.

Inversement, l'usage de tranquillisants et des somnifères est corrélé non seulement à l'existence de symptômes d'anxiété, d'insomnies qui ont justifié le recours aux médicaments, mais également à des difficultés dans la vie quotidienne, dans l'insertion professionnelle à un sentiment de solitude.

La situation du tabac est intermédiaire : très souvent associé à l'alcool, le tabagisme est fortement dépendant de l'environnement social et touche en priorité les jeunes, les urbains, les ouvriers. Pourtant, il peut être également corrélé, surtout chez les femmes à des signes d'anxiété, d'insatisfaction, de difficultés familiales ou professionnelles, et peut alors être associé aux tranquillisants.

Les différences de comportement entre les différentes tranches d'âges s'expliquent en partie par le changement de mode de vie, en partie pour des raisons médicales : régime, nécessité d'arrêter de fumer.

Plus étonnante est l'importance des différences d'attitude entre les hommes et les femmes. En particulier, il est difficile d'apprécier la signification du fréquent recours aux médicaments psychotropes chez les femmes.

ANNEXE STATISTIQUE

LISTE DES TABLEAUX

TABLEAU 1	EN LIGNE : 221 . age * sexe de l'enquêté(e) EN COLONNE : 96 . H4 - avez vous pris des somnifères ou des tranquillisants	
		= masculin
TABLEAU 2	EN LIGNE : 9 . A1 - statut matrimonial EN COLONNE : 98 . H4 - avez vous pris des somnifères ou des tranquillisants	
		= féminin
TABLEAU 3	EN LIGNE : 9 . A1 - statut matrimonial EN COLONNE : 98 . H4 - avez vous pris des somnifères ou des tranquillisants	
		= masculin
TABLEAU 4	EN LIGNE : 6 . situation actuelle de la personne interrogée EN COLONNE : 98 . H4 - avez vous pris des somnifères ou des tranquillisants	
		= féminin
TABLEAU 5	EN LIGNE : 6 . situation actuelle de la personne interrogée EN COLONNE : 98 . H4 - avez vous pris des somnifères ou des tranquillisants	
		= masculin
TABLEAU 6	EN LIGNE : 62 . E3 - avez vous des conflits travail - vie personnelle EN COLONNE : 98 . H4 - avez vous pris des somnifères ou des tranquillisants	
		= féminin
TABLEAU 7	EN LIGNE : 62 . E3 - avez vous des conflits travail - vie personnelle EN COLONNE : 98 . H4 - avez vous pris des somnifères ou des tranquillisants	
		= masculin
TABLEAU 8	EN LIGNE : 63 . E4 - avez vous été au chômage ces douze derniers mois ? EN COLONNE : 98 . H4 - avez vous pris des somnifères ou des tranquillisants	
		= féminin
TABLEAU 9	EN LIGNE : 63 . E4 - avez vous été au chômage ces douze derniers mois ? EN COLONNE : 98 . H4 - avez vous pris des somnifères ou des tranquillisants	
TABLEAU 10	EN LIGNE : 221 . age * sexe de l'enquêté(e) EN COLONNE : 146 . I11a - buvez vous des apéritifs ou des alcools	
TABLEAU 11	EN LIGNE : 221 . age * sexe de l'enquêté(e) EN COLONNE : 149 . I12a - au repas, que buvez vous de préférence ?	
TABLEAU 12	EN LIGNE : 221 . age * sexe de l'enquêté(e) EN COLONNE : 150 . I12b - combien en buvez vous, en moyenne, par repas ?	
		= masculin
TABLEAU 13	EN LIGNE : 9 . A1 - statut matrimonial EN COLONNE : 146 . I11a - buvez vous des apéritifs ou des alcools	
TABLEAU 14	EN LIGNE : 9 . A1 - statut matrimonial EN COLONNE : 149 . I12a - au repas, que buvez vous de préférence ?	
TABLEAU 15	EN LIGNE : 9 . A1 - statut matrimonial EN COLONNE : 150 . I12b - combien en buvez vous, en moyenne, par repas ?	

		sexe de l'enquêté(e)		= féminin
TABLEAU 16	EN LIGNE : 9	. A1 - statut matrimonial		
	EN COLONNE : 146	. I11a - buvez vous des apéritifs ou des alcools		
TABLEAU 17	EN LIGNE : 9	. A1 - statut matrimonial		
	EN COLONNE : 149	. I12a - au repas, que buvez vous de préférence ?		
TABLEAU 18	EN LIGNE : 9	. A1 - statut matrimonial		
	EN COLONNE : 150	. I12b - combien en buvez vous, en moyenne, par repas ?		
		sexe de l'enquêté(e)		= masculin
TABLEAU 19	EN LIGNE : 6	. situation actuelle de la personne interrogée		
	EN COLONNE : 146	. I11a - buvez vous des apéritifs ou des alcools		
TABLEAU 20	EN LIGNE : 6	. situation actuelle de la personne interrogée		
	EN COLONNE : 149	. I12a - au repas, que buvez vous de préférence ?		
TABLEAU 21	EN LIGNE : 6	. situation actuelle de la personne interrogée		
	EN COLONNE : 150	. I12b - combien en buvez vous, en moyenne, par repas ?		
		sexe de l'enquêté(e)		= féminin
TABLEAU 22	EN LIGNE : 6	. situation actuelle de la personne interrogée		
	EN COLONNE : 146	. I11a - buvez vous des apéritifs ou des alcools		
TABLEAU 23	EN LIGNE : 6	. situation actuelle de la personne interrogée		
	EN COLONNE : 149	. I12a - au repas, que buvez vous de préférence ?		
TABLEAU 24	EN LIGNE : 6	. situation actuelle de la personne interrogée		
	EN COLONNE : 150	. I12b - combien en buvez vous, en moyenne, par repas ?		
		sexe de l'enquêté(e)		= masculin
TABLEAU 25	EN LIGNE : 269	. catégorie socio-professionnelle (9 postes)		
	EN COLONNE : 146	. I11a - buvez vous des apéritifs ou des alcools		
TABLEAU 26	EN LIGNE : 269	. catégorie socio-professionnelle (9 postes)		
	EN COLONNE : 149	. I12a - au repas, que buvez vous de préférence ?		
TABLEAU 27	EN LIGNE : 269	. catégorie socio-professionnelle (9 postes)		
	EN COLONNE : 150	. I12b - combien en buvez vous, en moyenne, par repas ?		
		sexe de l'enquêté(e)		= féminin
TABLEAU 28	EN LIGNE : 269	. catégorie socio-professionnelle (9 postes)		
	EN COLONNE : 146	. I11a - buvez vous des apéritifs ou des alcools		
TABLEAU 29	EN LIGNE : 269	. catégorie socio-professionnelle (9 postes)		
	EN COLONNE : 149	. I12a - au repas, que buvez vous de préférence ?		
TABLEAU 30	EN LIGNE : 269	. catégorie socio-professionnelle (9 postes)		
	EN COLONNE : 150	. I12b - combien en buvez vous, en moyenne, par repas ?		
		sexe de l'enquêté(e)		= masculin
TABLEAU 31	EN LIGNE : 212	. diplôme d'enseignement général le plus élevé (R)		
	EN COLONNE : 146	. I11a - buvez vous des apéritifs ou des alcools		
TABLEAU 32	EN LIGNE : 212	. diplôme d'enseignement général le plus élevé (R)		
	EN COLONNE : 149	. I12a - au repas, que buvez vous de préférence ?		
TABLEAU 33	EN LIGNE : 212	. diplôme d'enseignement général le plus élevé (R)		
	EN COLONNE : 150	. I12b - combien en buvez vous, en moyenne, par repas ?		
		sexe de l'enquêté(e)		= féminin
TABLEAU 34	EN LIGNE : 212	. diplôme d'enseignement général le plus élevé (R)		
	EN COLONNE : 146	. I11a - buvez vous des apéritifs ou des alcools		
TABLEAU 35	EN LIGNE : 212	. diplôme d'enseignement général le plus élevé (R)		
	EN COLONNE : 149	. I12a - au repas, que buvez vous de préférence ?		
TABLEAU 36	EN LIGNE : 212	. diplôme d'enseignement général le plus élevé (R)		
	EN COLONNE : 150	. I12b - combien en buvez vous, en moyenne, par repas ?		
		sexe de l'enquêté(e)		= masculin
TABLEAU 37	EN LIGNE : 229	. taille d'agglomération		
	EN COLONNE : 146	. I11a - buvez vous des apéritifs ou des alcools		
TABLEAU 38	EN LIGNE : 229	. taille d'agglomération		
	EN COLONNE : 149	. I12a - au repas, que buvez vous de préférence ?		
TABLEAU 39	EN LIGNE : 229	. taille d'agglomération		
	EN COLONNE : 150	. I12b - combien en buvez vous, en moyenne, par repas ?		

			sexe de l'enquêté(e)	=	féminin
TABLEAU 40	EN LIGNE	: 229	taille d'agglomération		
	EN COLONNE	: 146	111a - buvez vous des apéritifs ou des alcools		
TABLEAU 41	EN LIGNE	: 229	taille d'agglomération		
	EN COLONNE	: 149	112a - au repas, que buvez vous de préférence ?		
TABLEAU 42	EN LIGNE	: 229	taille d'agglomération		
	EN COLONNE	: 150	112b - combien en buvez vous, en moyenne, par repas ?		
			sexe de l'enquêté(e)	=	masculin
TABLEAU 43	EN LIGNE	: 1	région où habite l'enquêté(e)		
	EN COLONNE	: 146	111a - buvez vous des apéritifs ou des alcools		
TABLEAU 44	EN LIGNE	: 1	région où habite l'enquêté(e)		
	EN COLONNE	: 149	112a - au repas, que buvez vous de préférence ?		
TABLEAU 45	EN LIGNE	: 1	région où habite l'enquêté(e)		
	EN COLONNE	: 150	112b - combien en buvez vous, en moyenne, par repas ?		
			sexe de l'enquêté(e)	=	féminin
TABLEAU 46	EN LIGNE	: 1	région où habite l'enquêté(e)		
	EN COLONNE	: 146	111a - buvez vous des apéritifs ou des alcools		
TABLEAU 47	EN LIGNE	: 1	région où habite l'enquêté(e)		
	EN COLONNE	: 149	112a - au repas, que buvez vous de préférence ?		
TABLEAU 48	EN LIGNE	: 1	région où habite l'enquêté(e)		
	EN COLONNE	: 150	112b - combien en buvez vous, en moyenne, par repas ?		
TABLEAU 49	EN LIGNE	: 221	âge * sexe de l'enquêté(e)		
	EN COLONNE	: 151	113 - combien fumez vous de cigarettes par jour, en moyenne		
			sexe de l'enquêté(e)	=	masculin
TABLEAU 50	EN LIGNE	: 6	situation actuelle de la personne interrogée		
	EN COLONNE	: 151	113 - combien fumez vous de cigarettes par jour, en moyenne		
			sexe de l'enquêté(e)	=	féminin
TABLEAU 51	EN LIGNE	: 6	situation actuelle de la personne interrogée		
	EN COLONNE	: 151	113 - combien fumez vous de cigarettes par jour, en moyenne		
			sexe de l'enquêté(e)	=	masculin
TABLEAU 52	EN LIGNE	: 269	catégorie socio-professionnelle (9 postes)		
	EN COLONNE	: 151	113 - combien fumez vous de cigarettes par jour, en moyenne		
			sexe de l'enquêté(e)	=	féminin
TABLEAU 53	EN LIGNE	: 269	catégorie socio-professionnelle (9 postes)		
	EN COLONNE	: 151	113 - combien fumez vous de cigarettes par jour, en moyenne		
			sexe de l'enquêté(e)	=	masculin
TABLEAU 54	EN LIGNE	: 209	S2 - zone où se trouve l'habitation		
	EN COLONNE	: 151	113 - combien fumez vous de cigarettes par jour, en moyenne		
			sexe de l'enquêté(e)	=	féminin
TABLEAU 55	EN LIGNE	: 209	S2 - zone où se trouve l'habitation		
	EN COLONNE	: 151	113 - combien fumez vous de cigarettes par jour, en moyenne		
			sexe de l'enquêté(e)	=	masculin
TABLEAU 56	EN LIGNE	: 229	taille d'agglomération		
	EN COLONNE	: 151	113 - combien fumez vous de cigarettes par jour, en moyenne		
			sexe de l'enquêté(e)	=	féminin
TABLEAU 57	EN LIGNE	: 229	taille d'agglomération		
	EN COLONNE	: 151	113 - combien fumez vous de cigarettes par jour, en moyenne		

sexe de l'enquêté(e) = masculin
 TABLEAU 58 EN LIGNE : 63 . E4 - avez vous été au chômage ces douze derniers mois ?
 EN COLONNE : 151 . I13 - combien fumez vous de cigarettes par jour, en moyenne

sexe de l'enquêté(e) = féminin
 TABLEAU 59 EN LIGNE : 63 . E4 - avez vous été au chômage ces douze derniers mois ?
 EN COLONNE : 151 . I13 - combien fumez vous de cigarettes par jour, en moyenne

sexe de l'enquêté(e) = masculin
 TABLEAU 60 EN LIGNE : 190 . M3 - etes-vous inquiet du risque du chômage
 EN COLONNE : 151 . I13 - combien fumez vous de cigarettes par jour, en moyenne

sexe de l'enquêté(e) = féminin
 TABLEAU 61 EN LIGNE : 190 . M3 - etes-vous inquiet du risque du chômage
 EN COLONNE : 151 . I13 - combien fumez vous de cigarettes par jour, en moyenne

TABLEAU 1 EN LIGNE : age * sexe de l'enqueté(e) POIDS TOTAL : 1895.
 EN COLONNE : H4 - avez vous pris des somnifères ou des tranquillisants

% COLONNE	POIDS		non. jamais		quelquefois		regulier.		ENSEMBLE		
	% LIGNE										
24 et moins hommes	8.65	118	87.11	6.51	17	12.89	0.00	0	7.13	135	100.00
25 à 39 ans hommes	19.74	268	84.79	11.87	32	10.04	6.11	16	16.70	316	100.00
40 à 59 ans hommes	15.42	210	79.77	9.00	24	9.16	10.84	29	13.86	263	100.00
60 et plus hommes	9.09	124	67.81	8.83	24	12.96	13.06	35	9.62	182	100.00
24 et moins femmes	7.69	104	82.24	7.56	20	15.97	0.85	2	6.70	127	100.00
25 à 39 ans femmes	17.65	240	74.86	16.55	50	15.46	11.58	31	16.94	321	100.00
40 à 59 ans femmes	12.25	167	61.58	16.52	44	16.31	22.34	60	14.30	271	100.00
60 et plus femmes	9.46	129	45.99	21.14	57	20.22	35.22	94	14.76	280	100.00
ENSEMBLE	100.00	1359	71.73	100.00	266	14.12	100.00	268	100.00	1895	100.00

CHI2 = 213.23 / 14 DEGRES DE LIBERTE / 0 EFFECTIFS THEORIQUES INFERIEURS A 5 / PROBA (CHI2 > 213.23) = 0.000 / V.TEST = 12.76

TABLEAU 2 EN LIGNE : A1 - statut matrimonial POIDS TOTAL : 896.
 EN COLONNE : H4 - avez vous pris des somnifères ou des tranquillisants

% COLONNE	POIDS		non. jamais		quelquefois		regulier.		ENSEMBLE		
	% LIGNE										
célibataire	24.58	177	84.44	27.65	27	12.80	7.17	6	23.34	209	100.00
marié(e)	60.55	435	79.10	57.61	56	10.14	73.58	59	61.40	550	100.00
concubinage	8.23	59	85.46	4.82	5	6.74	6.71	5	7.73	69	100.00
séparé(e) divorcé	5.12	37	82.75	4.99	5	10.86	3.53	3	4.97	45	100.00
veuf(ve)	1.52	11	47.65	4.93	5	20.79	9.01	7	2.56	23	100.00
ENSEMBLE	100.00	719	80.21	100.00	97	10.81	100.00	81	100.00	896	100.00

CHI2 = 32.50 / 8 DEGRES DE LIBERTE / 4 EFFECTIFS THEORIQUES INFERIEURS A 5 / PROBA (CHI2 > 32.50) = 0.000 / V.TEST = 3.79

TABLEAU 3 EN LIGNE : A1 - statut matrimonial EN COLONNE : H4 - avez vous pris des somnifères ou des tranquillisants POIDS TOTAL : 999.

sexe de l'enqueté(e)		= féminin			
% COLONNE	POIDS % LIGNE	non. jamais	quelquefois	regulier.	ENSEMBLE
célibataire	104 16.25	24 74.42	14.16	12 6.17	140 13.99
			17.29	8.29	100.00
marié(e)	375 58.57	90 69.50	52.89	74 39.59	540 54.03
			16.73	13.76	100.00
concubinage	53 8.28	16 65.12	9.63	12 6.36	81 8.15
			20.21	14.67	100.00
séparé(e) divorcé	33 5.08	17 48.36	10.25	17 9.20	67 6.74
			25.99	25.65	100.00
veuf(ve)	76 11.82	22 44.36	13.07	73 36.68	171 17.09
			13.08	42.57	100.00
ENSEMBLE	640 100.00	171 64.11	100.00	188 16.80	999 100.00

CHI2 = 92.14 / 8 DEGRES DE LIBERTE / 0 EFFECTIFS THEORIQUES INFERIEURS A 5 / PROBA (CHI2 > 92.14) = 0.000 / V.TEST = 8.16

TABLEAU 4 EN LIGNE : situation actuelle de la personne interrogée EN COLONNE : H4 - avez vous pris des somnifères ou des tranquillisants POIDS TOTAL : 896.

sexe de l'enqueté(e)		= masculin			
% COLONNE	POIDS % LIGNE	non. jamais	quelquefois	regulier.	ENSEMBLE
actif	483 67.19	59 84.65	60.89	29 5.02	571 63.67
			10.34		100.00
étudiant	61 8.44	6 91.28	5.99	0 0.00	66 7.42
			8.72	0.00	100.00
ménagère s.prof.	1 0.09	1 20.52	1.44	1 35.37	3 0.35
			44.11		100.00
malade invalide	11 1.46	5 57.42	4.93	3 16.46	18 2.04
			26.10		100.00
retraité	117 16.21	20 66.66	20.37	39 22.05	175 19.51
			11.28		100.00
chomeur	48 6.61	6 75.56	6.39	9 14.59	63 7.01
			9.85		100.00
ENSEMBLE	719 100.00	97 80.21	100.00	81 8.98	896 100.00

CHI2 = 71.89 / 10 DEGRES DE LIBERTE / 5 EFFECTIFS THEORIQUES INFERIEURS A 5 / PROBA (CHI2 > 71.89) = 0.000 / V.TEST = 6.61

TABLEAU 5 EN LIGNE : situation actuelle de la personne interrogée
 EN COLONNE : H4 - avez vous pris des somnifères ou des tranquillisants POIDS TOTAL : 999.

sexe de l'enquêté(e)					= féminin
% COLONNE	POIDS % LIGNE	non. jamais	quelquefois	regulier.	ENSEMBLE
actif	42.63 273 73.29	34.67 59 15.89	21.47 40 10.82	37.29 372	100.00
étudiant	6.29 40 86.46	3.06 5 11.54	0.00 0 0.00	4.56 46	100.00
ménagère	s.prof. 28.22 181 61.49	29.75 51 17.28	33.21 62 21.23	29.42 294	100.00
malade	invalide 1.06 7 36.14	2.09 4 19.00	4.49 8 44.86	1.88 19	100.00
retraité	14.42 92 45.36	23.73 40 19.89	37.67 71 34.75	20.38 204	100.00
chomeur	7.36 47 73.16	6.66 11 17.66	3.15 6 9.18	6.46 65	100.00
ENSEMBLE	100.00 640 64.11	100.00 171 17.09	100.00 188 18.80	100.00 999	100.00

CHI2 = 85.43 / 10 DEGRES DE LIBERTE / 2 EFFECTIFS THEORIQUES INFERIEURS A 5 / PROBA (CHI2 > 85.43) = 0.000 / V.TEST = 7.46

TABLEAU 6 EN LIGNE : E3 - avez vous des conflits travail - vie personnelle
 EN COLONNE : H4 - avez vous pris des somnifères ou des tranquillisants POIDS TOTAL : 571.

sexe de l'enquêté(e)					= masculin
% COLONNE	POIDS % LIGNE	non. jamais	quelquefois	regulier.	ENSEMBLE
- oui -	39.10 190 82.12	50.32 28 12.15	43.90 13 5.73	40.45 231	100.00
- non -	60.90 295 86.88	49.68 28 8.15	56.10 17 4.97	59.55 340	100.00
ENSEMBLE	100.00 485 84.95	100.00 56 9.77	100.00 30 5.28	100.00 571	100.00

CHI2 = 2.77 / 2 DEGRES DE LIBERTE / 0 EFFECTIFS THEORIQUES INFERIEURS A 5 / PROBA (CHI2 > 2.77) = 0.250 / V.TEST = 0.68

TABLEAU 7 EN LIGNE : E3 - avez vous des conflits travail - vie personnelle
 EN COLONNE : H4 - avez vous pris des somnifères ou des tranquillisants POIDS TOTAL : 366.

sexe de l'enquêté(e)					= féminin
% COLONNE	POIDS % LIGNE	non. jamais	quelquefois	regulier.	ENSEMBLE
- oui -	36.24 98 66.63	54.34 31 21.44	42.03 17 11.93	39.73 146	100.00
- non -	63.76 172 77.27	45.66 26 11.87	57.97 24 10.85	60.27 222	100.00
ENSEMBLE	100.00 269 73.05	100.00 58 15.67	100.00 42 11.28	100.00 366	100.00

CHI2 = 6.61 / 2 DEGRES DE LIBERTE / 0 EFFECTIFS THEORIQUES INFERIEURS A 5 / PROBA (CHI2 > 6.61) = 0.037 / V.TEST = 1.79

TABLEAU 8 EN LIGNE : E4 - avez vous été au chômage ces douze derniers mois ? POIDS TOTAL : 573
 EN COLONNE : H4 - avez vous pris des somnifères ou des tranquillisants

sexe de l'enquêté(e)		= masculin			
% COLONNE	POIDS % LIGNE	non. jamais	quelquefois	régulier.	ENSEMBLE
		- oui -	45 9.32	6 10.83	4 11.81
- non -	441 90.68	50 85.09	28 9.60	518 90.39	100.00
ENSEMBLE	486 100.00	56 84.83	31 9.73	573 100.00	100.00

CHI2 = 0.32 / 2 DEGRES DE LIBERTE / 1 EFFECTIFS THEORIQUES INFERIEURS A 5 / PROBA (CHI2 > 0.32) = 0.854 / V.TEST = -1.0

TABLEAU 9 EN LIGNE : E4 - avez vous été au chômage ces douze derniers mois ? POIDS TOTAL : 368
 EN COLONNE : H4 - avez vous pris des somnifères ou des tranquillisants

sexe de l'enquêté(e)		= féminin			
% COLONNE	POIDS % LIGNE	non. jamais	quelquefois	régulier.	ENSEMBLE
		- oui -	39 14.38	7 11.36	4 9.22
- non -	230 85.62	51 72.12	38 16.05	319 86.66	100.00
ENSEMBLE	269 100.00	58 73.00	42 15.70	368 100.00	100.00

CHI2 = 1.05 / 2 DEGRES DE LIBERTE / 0 EFFECTIFS THEORIQUES INFERIEURS A 5 / PROBA (CHI2 > 1.05) = 0.591 / V.TEST = -0.2

TABLEAU 10 EN LIGNE : age * sexe de l'enquêté(e) POIDS TOTAL : 1894
 EN COLONNE : I11a - buvez vous des apéritifs ou des alcools

% COLONNE	POIDS % LIGNE	tous les	plus. fois/	une fois /	moins 1 fois	Jamais	ENSEMBLE
		jours	semaine	semaine	/mois		
24 et moins hommes	4 7.89	2.85	17 8.60	39 12.81	48 26.90	27 7.78	135 7.13
25 à 39 ans hommes	13 27.01	4.16	80 39.76	95 25.26	91 29.90	38 14.77	316 16.71
40 à 59 ans hommes	15 31.20	5.79	32 15.77	91 12.06	80 34.70	45 12.96	263 13.87
60 et plus hommes	8 16.63	4.45	16 8.07	48 10.01	45 26.15	63 7.29	182 9.62
24 et moins femmes	1 2.62	1.01	6 3.01	28 4.77	50 22.21	41 8.12	127 6.71
25 à 39 ans femmes	2 3.92	0.59	24 12.07	73 7.56	130 22.64	92 21.05	321 16.95
40 à 59 ans femmes	1 2.32	0.42	21 10.22	39 7.59	99 14.55	111 16.01	271 14.31
60 et plus femmes	4 8.42	1.47	3 1.50	43 1.09	74 15.45	154 12.02	279 14.71
ENSEMBLE	49 100.00	2.57	201 100.00	456 10.62	617 24.07	572 32.55	1894 100.00

CHI2 = 308.26 / 28 DEGRES DE LIBERTE / 3 EFFECTIFS THEORIQUES INFERIEURS A 5 / PROBA (CHI2 > 308.26) = 0.000 / V.TEST = 14.6

TABLEAU 11 EN LIGNE : age * sexe de l'enquêté(e) POIDS TOTAL : 1895.
 EN COLONNE : i12a - au repas, que buvez vous de préférence ?

% COLONNE	POIDS		de vin	de la bière	de l'eau	autre	ENSEMBLE
	% LIGNE						
24 et moins hommes	3.61	18	0.00	0	8.75	7.13	135
		13.35	0.00	0.00	81.29	5.36	100.00
25 à 39 ans hommes	22.67	113	48.71	19	13.08	19.55	316
		35.74	6.09	6.09	51.91	6.27	100.00
40 à 59 ans hommes	25.11	125	24.73	10	9.41	9.43	263
		47.66	3.72	3.72	44.96	3.64	100.00
60 et plus hommes	20.47	102	4.18	2	5.59	8.15	182
		56.04	0.91	0.91	38.51	4.54	100.00
24 et moins femmes	1.06	5	0.00	0	8.93	9.50	127
		4.17	0.00	0.00	86.24	7.59	100.00
25 à 39 ans femmes	6.31	32	15.61	6	21.87	8.69	321
		9.81	1.92	1.92	85.51	2.75	100.00
40 à 59 ans femmes	7.08	35	6.77	3	17.39	14.51	271
		13.02	0.99	0.99	80.55	5.43	100.00
60 et plus femmes	13.66	66	0.00	0	14.98	23.04	280
		24.41	0.00	0.00	67.24	8.36	100.00
ENSEMBLE	100.00	499	100.00	40	100.00	100.00	1895
		26.32	2.09	2.09	66.24	5.35	100.00

CHI2 = 344.62 / 21 DEGRES DE LIBERTE / 3 EFFECTIFS THEORIQUES INFERIEURS A 5 / PROBA (CHI2 > 344.62) = 0.000 / V.TEST = 16.34

TABLEAU 12 EN LIGNE : age * sexe de l'enquêté(e) POIDS TOTAL : 568.
 EN COLONNE : i12b - combien en buvez vous, en moyenne, par repas ?

% COLONNE	POIDS		un litre ou plus	1/2 litre	1/4 litre	moins d'un 1/4 l.	ENSEMBLE
	% LIGNE						
24 et moins hommes	0.00	0	1.07	1	1.89	6.43	21
		0.00	4.39	4.39	18.45	77.16	100.00
25 à 39 ans hommes	11.62	2	40.27	35	27.32	15.73	134
		1.65	26.24	26.24	42.26	29.83	100.00
40 à 59 ans hommes	13.37	3	29.80	26	35.79	13.75	136
		1.84	18.89	18.89	53.86	25.38	100.00
60 et plus hommes	19.96	4	19.02	17	18.14	18.02	104
		3.65	16.00	16.00	36.23	44.12	100.00
24 et moins femmes	4.03	1	0.62	1	1.44	1.57	8
		9.25	6.54	6.54	36.06	46.15	100.00
25 à 39 ans femmes	24.46	5	0.00	0	4.74	11.42	44
		10.66	0.00	0.00	22.59	66.73	100.00
40 à 59 ans femmes	19.23	4	5.57	5	6.52	9.72	47
		7.81	10.40	10.40	26.93	52.86	100.00
60 et plus femmes	7.31	1	3.65	3	4.16	23.36	73
		1.91	4.39	4.39	11.89	81.80	100.00
ENSEMBLE	100.00	19	100.00	87	100.00	100.00	568
		3.34	15.38	15.38	36.52	44.76	100.00

CHI2 = 121.08 / 21 DEGRES DE LIBERTE / 12 EFFECTIFS THEORIQUES INFERIEURS A 5 / PROBA (CHI2 > 121.08) = 0.000 / V.TEST = 8.04

TABLEAU 13 EN LIGNE : A1 - statut matrimonial POIDS TOTAL : 896.
 EN COLONNE : I11a - buvez vous des apéritifs ou des alcools

sexe de l'enquêté(e)		= masculin					ENSEMBLE
% COLONNE	POIDS % LIGNE	tous les jours	plus. fois/ semaine	une fois / semaine	moins 1 fois /mois	jamais	
célibataire	7.69 ³ 1.48	27.61 ⁴¹ 19.44	24.06 ⁶⁶ 31.33	23.32 ⁶² 29.41	22.26 ³⁸ 18.34	23.34 ²⁰⁹ 100.00	
marié(e)	83.04 ³³ 6.08	61.07 ⁹⁰ 16.34	61.18 ¹⁶⁷ 30.28	61.39 ¹⁶² 29.43	57.01 ⁹⁸ 17.86	61.40 ⁵⁵⁰ 100.00	
concubinage	1.59 ¹ 0.93	6.63 ¹⁰ 14.10	7.41 ²⁰ 29.15	9.62 ²⁵ 36.67	7.69 ¹³ 19.16	7.73 ⁶⁹ 100.00	
séparé(e) divorcé	2.53 ¹ 2.29	3.52 ⁵ 11.64	5.91 ¹⁶ 36.17	4.75 ¹³ 28.16	5.61 ¹⁰ 21.74	4.97 ⁴⁵ 100.00	
veuf(ve)	5.15 ² 9.04	1.17 ² 7.51	1.45 ⁴ 17.14	0.92 ² 10.57	7.42 ¹³ 55.75	2.56 ²³ 100.00	
ENSEMBLE	100.00 ⁴⁰ 4.50	100.00 ¹⁴⁷ 16.43	100.00 ²⁷² 30.39	100.00 ²⁶⁴ 29.44	100.00 ¹⁷² 19.24	100.00 ⁸⁹⁶ 100.00	

CHI2 = 36.56 / 16 DEGRES DE LIBERTE / 5 EFFECTIFS THEORIQUES INFERIEURS A 5 / PROBA (CHI2 > 36.56) = 0.002 / V.TEST = 2.82

TABLEAU 14 EN LIGNE : A1 - statut matrimonial POIDS TOTAL : 896.
 EN COLONNE : I12a - au repas, que buvez vous de préférence ?

sexe de l'enquêté(e)		= masculin				ENSEMBLE
% COLONNE	POIDS % LIGNE	du vin	de la bière	de l'eau	autre	
célibataire	15.48 ⁵⁵ 26.52	16.11 ⁵ 2.36	30.01 ¹³⁹ 66.30	22.46 ¹⁰ 4.82	23.34 ²⁰⁹ 100.00	
marié(e)	68.30 ²⁴⁵ 44.49	62.00 ¹⁹ 3.46	55.67 ²⁵⁷ 46.76	64.88 ²⁹ 5.29	61.40 ⁵⁵⁰ 100.00	
concubinage	4.40 ¹⁶ 22.79	14.73 ⁵ 6.53	10.08 ⁴⁷ 67.31	5.20 ² 3.37	7.73 ⁶⁹ 100.00	
séparé(e) divorcé	8.54 ³¹ 68.74	3.32 ¹ 2.29	2.45 ¹¹ 25.39	3.55 ² 3.58	4.97 ⁴⁵ 100.00	
veuf(ve)	3.28 ¹² 51.19	3.83 ¹ 5.12	1.79 ⁸ 36.05	3.90 ² 7.63	2.56 ²³ 100.00	
ENSEMBLE	100.00 ³⁵⁹ 39.99	100.00 ³¹ 3.42	100.00 ⁴⁶² 51.57	100.00 ⁴⁵ 5.01	100.00 ⁸⁹⁶ 100.00	

CHI2 = 52.88 / 12 DEGRES DE LIBERTE / 6 EFFECTIFS THEORIQUES INFERIEURS A 5 / PROBA (CHI2 > 52.88) = 0.000 / V.TEST = 4.92

TABLEAU 15 EN LIGNE : A1 - statut matrimonial POIDS TOTAL : 397.
 EN COLONNE : I12b - combien en buvez vous, en moyenne, par repas ?

sexe de l'enqueté(e)		= masculin				
% COLONNE	POIDS	un litre ou plus	1/2 litre	1/4 litre	moins d'un 1/4 l.	ENSEMBLE
	% LIGNE					
célibataire	0.00 ⁰ 0.00	18.27 ¹⁴ 22.14	11.23 ¹⁹ 29.80	22.77 ³¹ 46.05	16.37 ⁶⁵ 100.00	
marié(e)	55.60 ⁵ 1.77	68.41 ⁵⁴ 20.13	72.02 ¹²⁴ 46.41	61.85 ⁸⁵ 31.69	67.44 ²⁶⁸ 100.00	
concubinage	0.00 ⁰ 0.00	5.53 ⁴ 20.79	5.65 ¹⁰ 46.53	4.99 ⁷ 32.66	5.28 ²¹ 100.00	
séparé(e) divorcé	44.40 ⁴ 12.47	3.61 ³ 9.35	10.43 ¹⁸ 59.19	4.21 ⁶ 18.98	7.66 ³⁰ 100.00	
veuf(ve)	0.00 ⁰ 0.00	4.19 ³ 25.46	0.67 ¹ 8.94	6.19 ⁸ 65.58	3.26 ¹³ 100.00	
ENSEMBLE	100.00 ⁹ 2.15	100.00 ⁷⁹ 19.84	100.00 ¹⁷² 43.45	100.00 ¹³⁷ 34.55	100.00 ³⁹⁷ 100.00	

CHI2 = 37.92 / 12 DEGRES DE LIBERTE / 7 EFFECTIFS THEORIQUES INFERIEURS A 5 / PROBA (CHI2 > 37.92) = 0.000 / V.TEST = 3.60

TABLEAU 16 EN LIGNE : A1 - statut matrimonial POIDS TOTAL : 996.
 EN COLONNE : I11a - buvez vous des apéritifs ou des alcools

sexe de l'enqueté(e)		= féminin					
% COLONNE	POIDS	tous les jours	plus. fois/ semaine	une fois / semaine	moins 1 fois / mois	jamais	ENSEMBLE
	% LIGNE						
célibataire	9.09 ¹ 0.55	13.90 ⁷ 5.37	16.52 ³⁰ 21.68	14.30 ⁵⁰ 36.10	12.71 ⁵¹ 36.31	14.01 ¹⁴⁰ 100.00	
marié(e)	23.70 ² 0.37	66.54 ³⁶ 6.65	59.84 ¹¹⁰ 20.34	55.29 ¹⁹⁵ 36.13	49.33 ¹⁹⁷ 36.51	54.08 ⁵⁴⁰ 100.00	
concubinage	8.73 ¹ 0.90	10.45 ⁶ 6.93	10.32 ¹⁹ 23.25	8.86 ³¹ 38.41	6.22 ²⁵ 30.51	8.16 ⁸¹ 100.00	
séparé(e) divorcé	9.74 ¹ 1.22	4.33 ² 3.47	5.03 ⁹ 13.71	9.49 ³³ 49.70	5.38 ²¹ 31.90	6.75 ⁶⁷ 100.00	
veuf(ve)	48.74 ⁴ 2.42	4.78 ³ 1.52	8.29 ¹⁵ 8.96	12.05 ⁴³ 25.05	26.37 ¹⁰⁵ 62.05	17.01 ¹⁷⁰ 100.00	
ENSEMBLE	100.00 ⁸ 0.84	100.00 ⁵⁴ 5.41	100.00 ¹⁸³ 18.38	100.00 ³⁵³ 35.34	100.00 ³⁹⁹ 40.03	100.00 ⁹⁹⁶ 100.00	

CHI2 = 60.80 / 16 DEGRES DE LIBERTE / 7 EFFECTIFS THEORIQUES INFERIEURS A 5 / PROBA (CHI2 > 60.80) = 0.000 / V.TEST = 4.94

TABLEAU 17 EN LIGNE : A1 - statut matrimonial POIDS TOTAL : 999.
 EN COLONNE : I12a - au repas, que buvez vous de préférence ?

sexe de l'enquêté(e)		= féminin				
% COLONNE	POIDS	du vin	de la bière	de l'eau	autre	ENSEMBLE
	% LIGNE					
célibataire	7.53 ¹¹ 7.56	0.00 ⁰ 0.00	15.49 ¹²³ 87.89	11.25 ⁶ 4.55	13.99 ¹⁴⁰ 100.00	
marié(e)	50.30 ⁷¹ 13.08	50.09 ⁴ 0.82	55.01 ⁴³⁶ 80.84	50.19 ²⁸ 5.26	54.03 ⁵⁴⁰ 100.00	
concubinage	7.29 ¹⁰ 12.56	17.34 ² 1.89	8.18 ⁶⁵ 79.75	8.33 ⁵ 5.79	8.15 ⁸¹ 100.00	
séparé(e) divorcé	6.42 ⁹ 13.36	13.71 ¹ 1.80	6.85 ⁵⁴ 80.66	4.94 ³ 4.15	6.74 ⁶⁷ 100.00	
veuf(ve)	28.47 ⁴⁰ 23.42	18.85 ² 0.96	14.47 ¹¹⁵ 67.22	25.30 ¹⁴ 8.39	17.09 ¹⁷¹ 100.00	
ENSEMBLE	100.00 ¹⁴⁰ 14.05	100.00 ⁹ 0.89	100.00 ⁷⁹² 79.40	100.00 ⁵⁷ 5.66	999 ⁹⁹⁹ 100.00	

CHI2 = 25.76 / 12 DEGRES DE LIBERTE / 7 EFFECTIFS THEORIQUES INFERIEURS A 5 / PROBA (CHI2 > 25.76) = 0.012 / V.TEST = 2.27

TABLEAU 16 EN LIGNE : A1 - statut matrimonial POIDS TOTAL : 171.
 EN COLONNE : I12b - combien en buvez vous, en moyenne, par repas ?

sexe de l'enquêté(e)		= féminin				
% COLONNE	POIDS	un litre ou plus	1/2 litre	1/4 litre	moins d'un 1/4 l.	ENSEMBLE
	% LIGNE					
célibataire	20.16 ² 15.24	12.57 ¹ 7.82	9.28 ³ 23.47	6.31 ⁷ 53.47	8.08 ¹⁴ 100.00	
marié(e)	53.83 ⁶ 6.47	40.34 ³ 3.99	52.89 ¹⁹ 21.26	50.67 ⁵⁹ 68.26	50.80 ⁸⁷ 100.00	
concubinage	0.00 ⁰ 0.00	0.00 ⁰ 0.00	9.82 ³ 24.85	8.87 ¹⁰ 75.15	8.07 ¹⁴ 100.00	
séparé(e) divorcé	10.05 ¹ 8.53	13.95 ¹ 9.73	5.08 ² 14.43	7.08 ⁸ 67.31	7.20 ¹² 100.00	
veuf(ve)	15.96 ² 3.77	33.14 ³ 6.44	22.94 ⁸ 18.13	27.07 ³² 71.66	25.85 ⁴⁴ 100.00	
ENSEMBLE	100.00 ¹⁰ 6.11	100.00 ⁹ 5.02	100.00 ³⁵ 20.44	100.00 ¹¹⁷ 66.43	171 ¹⁷¹ 100.00	

CHI2 = 6.25 / 12 DEGRES DE LIBERTE / 12 EFFECTIFS THEORIQUES INFERIEURS A 5 / PROBA (CHI2 > 6.25) = 0.903 / V.TEST = -1.30

TABLEAU 19 EN LIGNE : situation actuelle de la personne interrogée POIDS TOTAL : 896.
 EN COLONNE : 111a - buvez vous des apéritifs ou des alcools

sexe de l'enquêté(e)		= masculin					ENSEMBLE
% COLONNE	POIDS % LIGNE	tous les jours	plus. fois/ semaine	une fois / semaine	moins 1 fois /mois	jamais	
actif		55.46 ²² 3.92	77.10 ¹¹⁴ 19.90	71.71 ¹⁹⁵ 34.23	64.20 ¹⁶⁹ 29.68	40.60 ⁷⁰ 12.27	63.67 ⁵⁷¹ 100.00
étudiant		3.73 ² 2.26	7.61 ¹¹ 16.86	4.45 ¹² 18.25	9.71 ²⁶ 38.56	9.26 ¹⁶ 24.06	7.42 ⁶⁶ 100.00
ménagère	s.prof.	3.46 ¹ 44.11	0.44 ¹ 20.52	0.00 ⁰ 0.00	0.00 ⁰ 0.00	0.65 ¹ 35.37	0.35 ³ 100.00
malade	invalides	0.00 ⁰ 0.00	0.00 ⁰ 0.00	2.38 ⁶ 35.40	0.52 ¹ 7.50	6.06 ¹⁰ 57.10	2.04 ¹⁸ 100.00
retraité		17.53 ⁷ 4.04	10.16 ¹⁵ 8.56	15.67 ⁴³ 24.42	19.19 ⁵¹ 28.97	34.49 ⁵⁹ 34.01	19.51 ¹⁷⁵ 100.00
chomeur		19.82 ⁸ 12.72	4.69 ⁷ 10.98	5.78 ¹⁶ 25.06	6.37 ¹⁷ 26.74	8.93 ¹⁵ 24.50	7.01 ⁶³ 100.00
ENSEMBLE		100.00 ⁴⁰ 4.50	100.00 ¹⁴⁷ 16.43	100.00 ²⁷² 30.39	100.00 ²⁶⁴ 29.44	100.00 ¹⁷² 19.24	100.00 ⁸⁹⁶ 100.00

CHI2 = 103.24 / 20 DEGRES DE LIBERTE / 10 EFFECTIFS THEORIQUES INFERIEURS A 5 / PROBA (CHI2 > 103.24) = 0.000 / V.TEST = 7.19

TABLEAU 20 EN LIGNE : situation actuelle de la personne interrogée POIDS TOTAL : 896.
 EN COLONNE : 112a - au repas, que buvez vous de préférence ?

sexe de l'enquêté(e)		= masculin				ENSEMBLE
% COLONNE	POIDS % LIGNE	du vin	de la bière	de l'eau	autre	
actif		61.48 ²²⁰ 36.62	65.02 ²⁰ 3.50	65.20 ³⁰¹ 52.82	64.45 ²⁹ 5.07	63.67 ⁵⁷¹ 100.00
étudiant		2.09 ⁸ 11.29	1.87 ¹ 0.86	11.50 ⁵³ 79.99	11.64 ⁵ 7.86	7.42 ⁶⁶ 100.00
ménagère	s.prof.	0.70 ³ 79.48	0.00 ⁰ 0.00	0.14 ¹ 20.52	0.00 ⁰ 0.00	0.35 ³ 100.00
malade	invalides	1.36 ⁵ 26.67	11.82 ⁴ 19.82	2.12 ¹⁰ 53.51	0.00 ⁰ 0.00	2.04 ¹⁸ 100.00
retraité		25.99 ⁹³ 53.26	5.39 ² 0.95	15.69 ⁷³ 41.48	16.74 ⁸ 4.30	19.51 ¹⁷⁵ 100.00
chomeur		8.36 ³⁰ 47.78	15.91 ⁵ 7.76	5.35 ²⁵ 39.33	7.18 ³ 5.13	7.01 ⁶³ 100.00
ENSEMBLE		100.00 ³⁵⁹ 39.99	100.00 ³¹ 3.42	100.00 ⁴⁶² 51.57	100.00 ⁴⁵ 5.01	100.00 ⁸⁹⁶ 100.00

CHI2 = 65.85 / 15 DEGRES DE LIBERTE / 10 EFFECTIFS THEORIQUES INFERIEURS A 5 / PROBA (CHI2 > 65.85) = 0.000 / V.TEST = 5.46

TABLEAU 21 EN LIGNE : situation actuelle de la personne interrogée POIDS TOTAL : 397.
 EN COLONNE : I12b - combien en buvez vous, en moyenne, par repas ?

sexe de l'enqueté(e)		= masculin				
% COLONNE	POIDS % LIGNE	un litre ou plus	1/2 litre	1/4 litre	moins d'un 1/4 l.	ENSEMBLE
actif	55.60 ⁵ 1.93	64.81 ⁵¹ 20.72	66.91 ¹¹⁵ 46.85	54.78 ⁷⁵ 30.50	62.06 ²⁴⁶ 100.00	
étudiant	0.00 ⁰ 0.00	1.16 ¹ 8.77	1.20 ² 19.46	5.55 ⁶ 71.77	2.67 ¹¹ 100.00	
ménagère s.prof.	0.00 ⁰ 0.00	1.77 ¹ 55.50	0.00 ⁰ 0.00	0.81 ¹ 44.50	0.63 ³ 100.00	
malade invalide	25.78 ² 28.80	3.24 ³ 33.44	0.68 ¹ 15.30	1.25 ² 22.47	1.93 ⁶ 100.00	
retraité	18.62 ² 1.66	20.75 ¹⁶ 17.21	21.22 ³⁷ 36.56	29.45 ⁴⁰ 42.55	23.91 ⁹⁵ 100.00	
chomeur	0.00 ⁰ 0.00	8.25 ⁶ 18.60	9.99 ¹⁷ 49.36	8.16 ¹¹ 32.03	6.80 ³⁵ 100.00	
ENSEMBLE	100.00 ⁹ 2.15	100.00 ⁷⁹ 19.84	100.00 ¹⁷² 43.45	100.00 ¹³⁷ 34.55	100.00 ³⁹⁷ 100.00	

CHI2 = 42.84 / 15 DEGRES DE LIBERTE / 14 EFFECTIFS THEORIQUES INFERIEURS A 5 / PROBA (CHI2 > 42.84) = 0.000 / V.TEST = 3.59

TABLEAU 22 EN LIGNE : situation actuelle de la personne interrogée POIDS TOTAL : 996.
 EN COLONNE : I11a - buvez vous des apéritifs ou des alcools

sexe de l'enqueté(e)		= féminin					
% COLONNE	POIDS % LIGNE	tous les jours	plus. fois/ semaine	une fois / semaine	moins 1 fois /mois	jamais	ENSEMBLE
actif	42.20 ⁴ 0.95	51.06 ²⁸ 7.39	40.26 ⁷⁴ 19.82	43.97 ¹⁵⁵ 41.63	28.16 ¹¹² 30.20	37.33 ³⁷² 100.00	
étudiant	0.00 ⁰ 0.00	0.00 ⁰ 0.00	7.09 ¹³ 26.55	5.90 ²¹ 45.67	2.94 ¹² 25.78	4.56 ⁴⁶ 100.00	
ménagère s.prof.	9.06 ¹ 0.26	25.88 ¹⁴ 4.75	29.93 ⁵⁵ 18.69	24.90 ⁸⁶ 29.89	34.15 ¹³⁶ 46.42	29.45 ²⁹⁴ 100.00	
malade invalide	0.00 ⁰ 0.00	4.66 ³ 13.35	0.00 ⁰ 0.00	1.91 ⁷ 35.71	2.40 ¹⁰ 50.94	1.89 ¹⁹ 100.00	
retraité	48.74 ⁴ 2.03	6.74 ⁴ 1.79	16.18 ³⁰ 14.65	16.05 ⁵⁷ 27.94	27.19 ¹⁰⁹ 53.59	20.31 ²⁰³ 100.00	
chomeur	0.00 ⁰ 0.00	11.65 ⁶ 9.74	6.54 ¹² 16.57	7.26 ²⁶ 39.76	5.16 ²¹ 31.91	6.47 ⁶⁵ 100.00	
ENSEMBLE	100.00 ⁸ 0.84	100.00 ⁵⁴ 5.41	100.00 ¹⁸³ 18.38	100.00 ³⁵³ 35.34	100.00 ³⁹⁹ 40.03	100.00 ⁹⁹⁶ 100.00	

CHI2 = 65.17 / 20 DEGRES DE LIBERTE / 10 EFFECTIFS THEORIQUES INFERIEURS A 5 / PROBA (CHI2 > 65.17) = 0.000 / V.TEST = 4.73

TABLEAU 23 EN LIGNE : situation actuelle de la personne interrogée
 EN COLONNE : I12a - au repas, que buvez vous de préférence ? POIDS TOTAL : 999.

sexe de l'enquêté(e)		= féminin				ENSEMBLE
POIDS % COLONNE	% LIGNE	du vin	de la bière	de l'eau	autre	
actif		27.74 ³⁹ 10.45	44.16 ⁴ 1.05	36.72 ³⁰⁷ 82.44	39.86 ²³ 6.06	37.29 ³⁷² 100.00
étudiant		0.00 ⁰ 0.00	0.00 ⁰ 0.00	5.74 ⁴⁶ 100.00	0.00 ⁰ 0.00	4.56 ⁴⁶ 100.00
ménagère	s.prof.	25.64 ³⁶ 12.25	25.15 ² 0.76	29.66 ²³⁵ 80.05	36.04 ²⁰ 6.94	29.42 ²⁹⁴ 100.00
malade	invalides	0.00 ⁰ 0.00	0.00 ⁰ 0.00	2.29 ¹⁸ 96.64	1.12 ¹ 3.36	1.88 ¹⁹ 100.00
retraité		36.80 ⁵⁴ 26.75	0.00 ⁰ 0.00	17.16 ¹³⁶ 66.87	22.97 ¹³ 6.38	20.38 ²⁰⁴ 100.00
chomeur		7.82 ¹¹ 16.99	30.69 ³ 4.21	6.41 ⁵¹ 78.80	0.00 ⁰ 0.00	6.46 ⁶⁵ 100.00
ENSEMBLE		100.00 ¹⁴⁰ 14.05	100.00 ⁹ 0.89	100.00 ⁷⁹³ 79.40	100.00 ⁵⁷ 5.66	100.00 ⁹⁹⁹ 100.00

CHI2 = 62.65 / 15 DEGRES DE LIBERTE / 10 EFFECTIFS THEORIQUES INFERIEURS A 5 / PROBA (CHI2 > 62.65) = 0.000 / V.TEST = 5.22

TABLEAU 24 EN LIGNE : situation actuelle de la personne interrogée
 EN COLONNE : I12b - combien en buvez vous, en moyenne, par repas ? POIDS TOTAL : 171.

sexe de l'enquêté(e)		= féminin				ENSEMBLE
POIDS % COLONNE	% LIGNE	un litre ou plus	1/2 litre	1/4 litre	moins d'un 1/4 l.	
actif		36.12 ⁴ 7.43	37.36 ³ 6.32	36.44 ¹³ 25.09	26.53 ³¹ 61.16	29.69 ⁵¹ 100.00
étudiant		0.00 ⁰ 0.00	0.00 ⁰ 0.00	5.50 ² 100.00	0.00 ⁰ 0.00	1.12 ² 100.00
ménagère	s.prof.	29.26 ³ 6.86	36.39 ³ 7.04	23.88 ⁸ 18.79	25.53 ³⁰ 67.29	25.97 ⁴⁴ 100.00
malade	invalides	13.28 ¹ 50.42	0.00 ⁰ 0.00	3.90 ¹ 49.58	0.00 ⁰ 0.00	1.61 ³ 100.00
retraité		0.00 ⁰ 0.00	26.25 ² 3.99	21.32 ⁷ 13.20	39.94 ⁴⁷ 82.81	33.01 ⁵⁷ 100.00
chomeur		21.34 ² 15.15	0.00 ⁰ 0.00	8.96 ³ 21.27	8.00 ⁹ 63.58	8.61 ¹⁵ 100.00
ENSEMBLE		100.00 ¹⁰ 6.11	100.00 ⁹ 5.02	100.00 ³⁵ 20.44	100.00 ¹¹⁷ 68.43	100.00 ¹⁷¹ 100.00

CHI2 = 30.72 / 15 DEGRES DE LIBERTE / 17 EFFECTIFS THEORIQUES INFERIEURS A 5 / PROBA (CHI2 > 30.72) = 0.010 / V.TEST = 2.34

TABLEAU 25 EN LIGNE : catégorie socio-professionnelle (9 postes) POIDS TOTAL : 896.
 EN COLONNE : 111a - buvez vous des apéritifs ou des alcools

sexe de l'enqueté(e)		= masculin					
% COLONNE	POIDS	tous les	plus. fois/	une fois /	moins 1 fois	Jamais	ENSEMBLE
	% LIGNE	jours	semaine	semaine	/mois		
exploitant agricole	6.60 ³	6.07	3.36 ⁵ 11.30	6.12 ¹⁷ 38.07	6.18 ¹⁶ 37.19	1.87 ³ 7.37	4.89 ⁴⁴ 100.00
ouv. agr/ser/ouvriers	35.09 ¹⁴	5.22	29.07 ⁴³ 15.80	37.62 ¹⁰³ 37.84	28.33 ⁷⁵ 27.60	21.25 ³⁷ 13.53	30.22 ²⁷¹ 100.00
art.comm. chef ent	3.56 ¹	2.80	8.66 ¹³ 24.86	7.31 ²⁰ 38.82	4.67 ¹² 24.01	2.83 ⁵ 9.51	5.72 ⁵¹ 100.00
cadre.prof. int.sup.	4.94 ²	3.46	10.36 ¹⁵ 26.51	4.35 ¹² 20.61	6.56 ¹⁷ 30.09	6.44 ¹¹ 19.31	6.42 ⁵⁸ 100.00
profession interr.	18.17 ⁷	5.90	20.86 ³¹ 24.74	12.99 ³⁵ 28.51	15.38 ⁴¹ 32.68	5.88 ¹⁰ 8.16	13.85 ¹²⁴ 100.00
employé	6.92 ³	3.37	10.36 ¹⁵ 18.43	8.53 ²³ 28.07	9.46 ²⁵ 30.13	9.61 ¹⁷ 20.01	9.24 ⁸³ 100.00
étudiant	3.73 ²	2.31	6.73 ¹⁰ 15.20	4.45 ¹² 18.61	9.71 ²⁶ 39.33	9.28 ¹⁶ 24.55	7.27 ⁶⁵ 100.00
ménagère aut. ina.	3.46 ¹	5.40	0.44 ¹ 2.51	2.94 ⁸ 31.00	0.52 ¹ 5.32	8.35 ¹⁴ 55.77	2.86 ²⁶ 100.00
retraité	17.53 ⁷	4.04	10.16 ¹⁵ 8.56	15.67 ⁴³ 24.42	19.19 ⁵¹ 28.97	34.49 ⁵⁹ 34.01	19.51 ¹⁷⁵ 100.00
ENSEMBLE	100.00 ⁴⁰	4.50	100.00 ¹⁴⁷ 16.43	100.00 ²⁷² 30.39	100.00 ²⁶⁴ 29.44	100.00 ¹⁷² 19.24	100.00 ⁸⁹⁶ 100.00

CHI2 = 104.86 / 32 DEGRES DE LIBERTE / 6 EFFECTIFS THEORIQUES INFERIEURS A 5 / PROBA (CHI2 > 104.86) = 0.000 / V.TEST = 5.96

TABLEAU 26 EN LIGNE : catégorie socio-professionnelle (9 postes) POIDS TOTAL : 896.
 EN COLONNE : 112a - au repas, que buvez vous de préférence ?

sexe de l'enqueté(e)		= masculin				
% COLONNE	POIDS	du vin	de la bière	de l'eau	autre	ENSEMBLE
	% LIGNE					
exploitant agricole	6.66 ²⁴	54.47	0.00 ⁰ 0.00	3.79 ¹⁸ 39.95	5.45 ² 5.58	4.89 ⁴⁴ 100.00
ouv. agr/ser/ouvriers	29.36 ¹⁰⁵	38.85	54.44 ¹⁷ 6.17	27.79 ¹²⁸ 47.43	45.60 ²⁰ 7.56	30.22 ²⁷¹ 100.00
art.comm. chef ent	6.46 ²³	45.17	9.32 ³ 5.57	5.47 ²⁵ 49.26	0.00 ⁰ 0.00	5.72 ⁵¹ 100.00
cadre.prof. int.sup.	5.64 ²⁰	35.16	2.54 ¹ 1.36	7.25 ³⁴ 56.26	6.70 ³ 5.23	6.42 ⁵⁸ 100.00
profession interr.	13.60 ⁴⁹	39.26	14.62 ⁴ 3.61	14.42 ⁶⁷ 53.69	9.50 ⁴ 3.44	13.85 ¹²⁴ 100.00
employé	7.76 ²⁶	33.58	0.00 ⁰ 0.00	11.48 ⁵³ 64.05	4.36 ² 2.27	9.24 ⁸³ 100.00
étudiant	2.09 ⁸	11.51	1.87 ¹ 0.88	11.22 ⁵² 79.59	11.64 ⁵ 8.02	7.27 ⁶⁵ 100.00
ménagère aut. ina.	2.44 ⁹	33.94	11.82 ⁴ 14.05	2.90 ¹³ 52.01	0.00 ⁰ 0.00	2.86 ²⁶ 100.00
retraité	25.99 ⁹³	53.28	5.39 ² 0.95	15.69 ⁷³ 41.48	16.74 ⁸ 4.30	19.51 ¹⁷⁵ 100.00
ENSEMBLE	100.00 ³⁵⁹	39.99	100.00 ³¹ 3.42	100.00 ⁴⁶² 51.57	100.00 ⁴⁵ 5.01	100.00 ⁸⁹⁶ 100.00

CHI2 = 78.83 / 24 DEGRES DE LIBERTE / 13 EFFECTIFS THEORIQUES INFERIEURS A 5 / PROBA (CHI2 > 78.83) = 0.000 / V.TEST = 5.21

POIDS TOTAL : 397.

TABEAU 27 EN LIGNE : catégorie socio-professionnelle (9 postes)
EN COLONNE : 112b - combien en buvez vous, en moyenne, par repas ?

sexe de l'enquêté(e)		= masculin				ENSEMBLE
POIDS % COLONNE	% LIGNE	un litre ou plus	1/2 litre	1/4 litre	moins d'un 1/4 l.	
exploitant agricole	0.00	0.00	3.52	9.49	4.93	6.52
			10.70	63.19	26.11	100.00
ouv. agr/ser/ouvriers	30.47	2.12	39.33	29.18	28.39	30.95
			25.22	40.97	31.69	100.00
art.comm. chef ent	12.78	4.02	4.61	7.39	7.04	6.83
			13.40	46.99	35.58	100.00
cadre.prof. int.sup.	0.00	0.00	4.56	6.23	4.87	5.29
			17.09	51.14	31.77	100.00
profession interm.	12.35	1.91	11.03	17.53	11.11	13.91
			15.74	54.76	27.59	100.00
employé	0.00	0.00	10.00	7.10	5.61	7.01
			28.32	44.02	27.67	100.00
étudiant	0.00	0.00	1.18	1.20	5.55	2.67
			8.77	19.46	71.77	100.00
ménagère aut. ina.	25.78	19.10	5.01	0.68	3.07	2.90
			34.26	10.15	36.50	100.00
retraité	18.62	1.68	20.75	21.22	29.45	23.91
			17.21	38.56	42.55	100.00
ENSEMBLE	100.00	2.15	100.00	100.00	100.00	100.00
			19.84	43.45	34.55	100.00

CHI2 = 42.39 / 24 DEGRES DE LIBERTE / 15 EFFECTIFS THEORIQUES INFERIEURS A 5 / PROBA (CHI2 > 42.39) = 0.012 / V.TEST = 2.27

POIDS TOTAL : 998.

TABEAU 28 EN LIGNE : catégorie socio-professionnelle (9 postes)
EN COLONNE : 111a - buvez vous des apéritifs ou des alcools

sexe de l'enquêté(e)		= féminin					ENSEMBLE
POIDS % COLONNE	% LIGNE	tous les jours	plus. fois/ semaine	une fois / semaine	moins 1 fois /mois	jamais	
exploitant agricole	0.00	0.00	1.20	4.78	3.46	2.06	2.99
			2.16	29.35	40.91	27.58	100.00
ouv. agr/ser/ouvriers	0.00	0.00	17.48	10.69	12.28	6.74	9.95
			9.50	19.75	43.63	27.13	100.00
art.comm. chef ent	0.00	0.00	6.18	4.29	4.74	2.03	3.61
			9.24	21.85	46.38	22.53	100.00
cadre.prof. int.sup.	8.73	2.51	5.93	2.96	2.53	2.77	2.94
			10.89	18.51	30.39	37.69	100.00
profession interm.	17.64	2.25	16.48	6.59	8.61	3.32	6.62
			13.45	18.28	45.95	20.08	100.00
employé	15.84	0.78	15.45	16.82	18.90	16.21	17.23
			4.85	17.94	38.77	37.66	100.00
étudiant	0.00	0.00	0.00	7.09	6.15	2.94	4.65
			0.00	28.00	46.72	25.28	100.00
ménagère aut. ina.	9.06	0.24	30.54	30.59	27.27	36.72	31.69
			5.21	17.75	30.41	46.39	100.00
retraité	48.74	2.03	6.74	16.18	16.05	27.19	20.31
			1.79	14.65	27.94	53.59	100.00
ENSEMBLE	100.00	0.84	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
			5.41	18.38	35.34	40.03	100.00

CHI2 = 80.22 / 32 DEGRES DE LIBERTE / 14 EFFECTIFS THEORIQUES INFERIEURS A 5 / PROBA (CHI2 > 80.22) = 0.000 / V.TEST = 4.41

TABLEAU 29 EN LIGNE : catégorie socio-professionnelle (9 postes) POIDS TOTAL : 999.
 EN COLONNE : 112a - au repas, que buvez vous de préférence ?

sexe de l'enquêté(e)		= féminin				ENSEMBLE
% COLONNE	POIDS % LIGNE	du vin	de la bière	de l'eau	autre	
exploitant agricole	2.63 ⁴ 12.38	0.00 ⁰ 0.00	2.79 ²² 74.04	7.17 ⁴ 13.58	2.99 ³⁰ 100.00	
ouv. agr/ser/ouvriers	10.53 ¹⁵ 14.89	42.29 ⁴ 3.77	9.46 ⁷⁵ 75.56	10.14 ⁶ 5.78	9.94 ⁹⁹ 100.00	
art.comm. chef ent	2.85 ⁴ 11.11	0.00 ⁰ 0.00	4.04 ³² 86.89	0.00 ⁰ 0.00	3.61 ³⁶ 100.00	
cadre.prof. int.sup.	1.96 ³ 9.38	0.00 ⁰ 0.00	3.22 ²⁶ 86.99	1.88 ¹ 3.63	2.94 ²⁹ 100.00	
profession interr.	4.58 ⁶ 9.73	0.00 ⁰ 0.00	7.52 ⁶⁰ 90.27	0.00 ⁰ 0.00	6.62 ⁶⁶ 100.00	
employé	12.70 ¹⁶ 10.37	32.56 ³ 1.68	17.59 ¹⁴⁰ 81.15	20.69 ¹² 6.81	17.21 ¹⁷² 100.00	
étudiant	0.00 ⁰ 0.00	0.00 ⁰ 0.00	5.85 ⁴⁶ 100.00	0.00 ⁰ 0.00	4.65 ⁴⁶ 100.00	
ménagère aut. ina.	25.93 ³⁶ 11.51	25.15 ² 0.70	32.35 ²⁵⁷ 81.14	37.16 ²¹ 6.65	31.66 ³¹⁶ 100.00	
retraité	38.80 ⁵⁴ 26.75	0.00 ⁰ 0.00	17.16 ¹³⁶ 66.67	22.97 ¹³ 6.38	20.36 ²⁰⁴ 100.00	
ENSEMBLE	100.00 ¹⁴⁰ 14.05	100.00 ⁹ 0.89	100.00 ⁷⁹³ 79.40	100.00 ⁵⁷ 5.66	100.00 ⁹⁹⁹ 100.00	

CHI2 = 70.60 / 24 DEGRES DE LIBERTE / 16 EFFECTIFS THEORIQUES INFERIEURS A 5 / PROBA (CHI2 > 70.60) = 0.000 / V.TEST = 4.6

TABLEAU 30 EN LIGNE : catégorie socio-professionnelle (9 postes) POIDS TOTAL : 171.
 EN COLONNE : 112b - combien en buvez vous, en moyenne, par repas ?

sexe de l'enquêté(e)		= féminin				ENSEMBLE
% COLONNE	POIDS % LIGNE	un litre ou plus	1/2 litre	1/4 litre	moins d'un 1/4 l.	
exploitant agricole	0.00 ⁰ 0.00	0.00 ⁰ 0.00	5.16 ² 24.06	4.86 ⁶ 75.94	4.38 ⁸ 100.00	
ouv. agr/ser/ouvriers	27.25 ³ 14.65	23.41 ² 10.34	3.95 ¹ 7.10	11.28 ¹³ 67.91	11.36 ¹⁹ 100.00	
art.comm. chef ent	0.00 ⁰ 0.00	0.00 ⁰ 0.00	2.84 ¹ 24.85	2.57 ³ 75.15	2.34 ⁴ 100.00	
cadre.prof. int.sup.	0.00 ⁰ 0.00	13.95 ¹ 43.58	2.10 ¹ 26.72	0.70 ¹ 29.70	1.61 ³ 100.00	
profession interr.	20.16 ² 25.29	0.00 ⁰ 0.00	9.97 ³ 41.82	2.34 ³ 32.89	4.87 ⁸ 100.00	
employé	10.05 ¹ 4.55	0.00 ⁰ 0.00	20.21 ⁷ 30.61	12.78 ¹⁵ 64.84	13.49 ²³ 100.00	
étudiant	0.00 ⁰ 0.00	0.00 ⁰ 0.00	5.50 ² 100.00	0.00 ⁰ 0.00	1.12 ² 100.00	
ménagère aut. ina.	42.54 ⁴ 9.34	36.39 ³ 6.57	28.96 ¹⁰ 21.27	25.53 ³⁰ 62.82	27.82 ⁴⁸ 100.00	
retraité	0.00 ⁰ 0.00	26.25 ² 3.99	21.32 ⁷ 13.20	39.94 ⁴⁷ 82.81	33.01 ⁵⁷ 100.00	
ENSEMBLE	100.00 ¹⁰ 6.11	100.00 ⁹ 5.02	100.00 ³⁵ 20.44	100.00 ¹¹⁷ 68.43	100.00 ¹⁷¹ 100.00	

CHI2 = 42.35 / 24 DEGRES DE LIBERTE / 28 EFFECTIFS THEORIQUES INFERIEURS A 5 / PROBA (CHI2 > 42.35) = 0.012 / V.TEST = 2.2

TABLEAU 31 EN LIGNE : diplôme d'enseignement général le plus élevé (R) POIDS TOTAL : 896.
 EN COLONNE : I11a - buvez vous des apéritifs ou des alcools

sexe de l'enquêté(e)		= masculin					ENSEMBLE
% COLONNE	POIDS % LIGNE	tous les jours	plus. fois/ semaine	une fois / semaine	moins 1 fois /mois	jamais	
aucun		13 31.96	39 26.30	74 27.29	60 22.75	59 34.46	245 27.38
		5.25	15.78	30.29	24.46	24.21	100.00
cep		11 28.10	49 33.09	99 36.20	97 36.75	55 31.72	310 34.62
		3.65	15.70	31.78	31.24	17.62	100.00
bepc, beps, be		6 15.58	19 12.93	45 16.45	34 12.84	24 13.73	128 14.25
		4.92	14.91	35.09	26.55	18.54	100.00
bac. brevet sup.		4 10.39	14 9.44	28 10.16	45 16.90	20 11.37	110 12.27
		3.81	12.64	25.16	40.55	17.83	100.00
université, p. école		5 13.10	26 17.75	24 8.68	26 9.72	14 8.05	95 10.56
		5.56	27.63	24.99	27.12	14.68	100.00
autre		0 0.88	1 0.49	3 1.22	3 1.03	1 0.67	8 0.93
		4.26	6.77	40.17	32.81	13.97	100.00
ENSEMBLE		40 100.00	147 100.00	272 100.00	264 100.00	172 100.00	896 100.00
		4.50	16.43	30.39	29.44	19.24	100.00

CHI2 = 25.76 / 20 DEGRES DE LIBERTE / 7 EFFECTIFS THEORIQUES INFERIEURS A 5 / PROBA (CHI2 > 25.76) = 0.173 / V.TEST = 0.94

TABLEAU 32 EN LIGNE : diplôme d'enseignement général le plus élevé (R) POIDS TOTAL : 896.
 EN COLONNE : I12a - au repas, que buvez vous de préférence ?

sexe de l'enquêté(e)		= masculin				ENSEMBLE
% COLONNE	POIDS % LIGNE	du vin	de la bière	de l'eau	autre	
aucun		112 31.21	10 31.25	107 23.24	17 36.78	245 27.36
		45.58	3.91	43.78	6.73	100.00
cep		127 35.56	14 47.09	153 33.18	15 33.59	310 34.62
		41.07	4.66	49.42	4.86	100.00
bepc, beps, be		48 13.29	2 5.00	74 16.00	5 10.08	128 14.25
		37.32	1.20	57.93	3.54	100.00
bac. brevet sup.		32 8.99	2 6.33	72 15.53	4 8.84	110 12.27
		29.32	1.77	65.31	3.61	100.00
université, p. école		35 9.70	3 10.33	53 11.40	4 8.88	95 10.56
		36.75	3.35	55.69	4.21	100.00
autre		4 1.25	0 0.00	3 0.65	1 1.83	8 0.93
		54.02	0.00	36.07	9.92	100.00
ENSEMBLE		359 100.00	31 100.00	462 100.00	45 100.00	896 100.00
		39.99	3.42	51.57	5.01	100.00

CHI2 = 22.43 / 15 DEGRES DE LIBERTE / 8 EFFECTIFS THEORIQUES INFERIEURS A 5 / PROBA (CHI2 > 22.43) = 0.097 / V.TEST = 1.30

TABLEAU 33 EN LIGNE : diplôme d'enseignement général le plus élevé (R) POIDS TOTAL : 397.
 EN COLONNE : I12b - combien en buvez vous, en moyenne, par repas ?

% COLONNE	POIDS % LIGNE	sexe de l'enquêté(e)				ENSEMBLE
		= masculin				
		un litre ou plus	1/2 litre	1/4 litre	moins d'un 1/4 l.	
aucun	74.87	5.18	33.86	29.41	28.94	31.11
			27	51	40	123
			21.61	41.08	32.14	100.00
cep	0.00	0.00	44.89	34.94	34.38	35.97
			35	60	47	143
			24.76	42.21	33.03	100.00
bepc.beps.be	12.76	2.10	6.15	15.06	14.54	13.07
			5	26	20	52
			9.34	50.13	38.43	100.00
bac. brevet sup.	12.35	3.09	6.91	9.66	8.01	6.61
			5	17	11	34
			15.92	48.87	32.13	100.00
université. p.école	0.00	0.00	7.72	9.96	12.30	10.11
			6	17	17	40
			15.16	42.81	42.03	100.00
autre	0.00	0.00	0.45	0.93	1.84	1.13
			0	2	3	4
			7.92	35.84	56.24	100.00
ENSEMBLE	100.00	2.15	100.00	100.00	100.00	100.00
			79	172	137	397
			19.84	43.45	34.55	100.00

CHI2 = 18.16 / 15 DEGRES DE LIBERTE / 9 EFFECTIFS THEORIQUES INFERIEURS A 5 / PROBA (CHI2 > 18.16) = 0.254 / V.TEST = 0.67

TABLEAU 34 EN LIGNE : diplôme d'enseignement général le plus élevé (R) POIDS TOTAL : 996.
 EN COLONNE : I11a - buvez vous des apéritifs ou des alcools

% COLONNE	POIDS % LIGNE	sexe de l'enquêté(e)					ENSEMBLE
		= féminin					
		tous les jours	plus. fois/ semaine	une fois / semaine	moins 1 fois /mois	jamais	
aucun	33.25	0.89	16.06	19.22	26.55	43.55	31.50
			9	35	94	174	314
			2.76	11.22	29.79	55.34	100.00
cep	0.00	0.00	30.09	33.43	29.45	28.51	29.59
			16	61	104	114	295
			5.50	20.76	35.17	36.57	100.00
bepc.beps.be	0.00	0.00	24.71	19.73	20.73	12.93	17.46
			13	36	73	52	174
			7.65	20.77	41.95	29.64	100.00
bac. brevet sup.	24.03	1.74	15.14	14.12	13.91	7.90	11.69
			8	26	49	32	117
			7.00	22.19	42.03	27.04	100.00
université. p.école	38.54	3.79	10.32	12.17	8.12	6.47	8.58
			6	22	29	26	86
			6.51	26.08	33.44	30.18	100.00
autre	4.19	2.99	3.68	1.34	1.26	0.64	1.18
			2	2	4	3	12
			16.83	20.81	37.59	21.79	100.00
ENSEMBLE	100.00	0.84	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
			54	183	353	399	996
			5.41	18.38	35.34	40.03	100.00

CHI2 = 75.49 / 20 DEGRES DE LIBERTE / 11 EFFECTIFS THEORIQUES INFERIEURS A 5 / PROBA (CHI2 > 75.49) = 0.000 / V.TEST = 5.47

TABLEAU 35 EN LIGNE : diplôme d'enseignement général le plus élevé (R) POIDS TOTAL : 999.
 EN COLONNE : 112a - au repas, que buvez vous de préférence ?

%	sexe de l'enquêté(e)		= féminin				ENSEMBLE
	POIDS % COLONNE	% LIGNE	du vin	de la bière	de l'eau	autre	
aucun	30.60	13.67	43 53.88	5 1.52	234 29.49	33 74.41	314 100.00
cep	32.36	15.34	45 8.32	1 0.25	235 29.59	15 79.22	296 100.00
bedc.beds.be	20.28	16.33	28 13.71	1 0.70	143 18.04	2 82.10	174 100.00
bac. brevet sup.	7.30	8.78	10 0.00	0 0.00	102 12.85	5 87.36	117 100.00
université. g.école	8.28	13.57	12 24.09	2 2.49	70 8.79	2 81.47	86 100.00
autre	1.16	14.00	2 0.00	0 0.00	10 1.24	0 83.18	12 100.00
ENSEMBLE	100.00	14.05	140 100.00	9 0.89	793 100.00	57 79.40	999 100.00

CHI2 = 34.02 / 15 DEGRES DE LIBERTE / 9 EFFECTIFS THEORIQUES INFERIEURS A 5 / PROBA (CHI2 > 34.02) = 0.003 / V.TEST = 2.71

TABLEAU 36 EN LIGNE : diplôme d'enseignement général le plus élevé (R) POIDS TOTAL : 171.
 EN COLONNE : 112b - combien en buvez vous, en moyenne, par repas ?

%	sexe de l'enquêté(e)		= féminin				ENSEMBLE
	POIDS % COLONNE	% LIGNE	un litre ou plus	1/2 litre	1/4 litre	moins d'un 1/4 l.	
aucun	61.02	10.90	6 30.51	3 4.48	11 30.19	39 18.04	59 100.00
cep	10.05	2.02	1 21.91	2 3.63	10 27.17	40 16.30	52 100.00
bedc.beds.be	21.60	7.08	2 0.00	0 0.00	7 19.50	23 21.36	32 100.00
bac. brevet sup.	0.00	0.00	0 15.17	1 10.72	4 10.71	7 30.80	12 100.00
université. g.école	7.33	5.35	1 26.13	2 15.70	3 9.79	8 23.92	14 100.00
autre	0.00	0.00	0 6.27	1 23.36	1 2.65	1 40.15	2 100.00
ENSEMBLE	100.00	6.11	10 100.00	9 5.02	35 100.00	117 20.44	171 100.00

CHI2 = 14.86 / 15 DEGRES DE LIBERTE / 16 EFFECTIFS THEORIQUES INFERIEURS A 5 / PROBA (CHI2 > 14.86) = 0.462 / V.TEST = 0.10

TABLEAU 37 EN LIGNE : taille d'agglomération
EN COLONNE : 111a - buvez vous des apéritifs ou des alcools POIDS TOTAL : 896.

sexe de l'enquêté(e)		= masculin					ENSEMBLE
% COLONNE	POIDS % LIGNE	tous les jours	plus. fois/ semaine	une fois / semaine	moins 1 fois /mois	Jamais	
moins de 2000	31.56	13 5.16	40 27.39	89 16.35	64 32.75	40 26.03	247 27.52
plus de 2000	50.46	20 4.01	79 53.82	146 15.61	154 53.52	106 30.32	508 56.66
Paris.agglo.paris	17.95	7 5.10	26 18.79	37 19.50	46 13.72	24 26.35	142 15.83
ENSEMBLE	100.00	40 4.50	147 100.00	272 16.43	264 100.00	172 29.44	896 100.00

CHI2 = 9.80 / 8 DEGRES DE LIBERTE / 0 EFFECTIFS THEORIQUES INFERIEURS A 5 / PROBA (CHI2 > 9.80) = 0.279 / V.TEST = 0.51

TABLEAU 38 EN LIGNE : taille d'agglomération
EN COLONNE : 112a - au repas, que buvez vous de préférence ? POIDS TOTAL : 896.

sexe de l'enquêté(e)		= masculin				ENSEMBLE
% COLONNE	POIDS % LIGNE	du vin	de la bière	de l'eau	autre	
moins de 2000	33.30	119 46.39	8 24.86	110 3.09	10 23.72	247 44.46
plus de 2000	48.66	174 34.35	20 65.37	286 3.95	27 61.88	508 56.39
Paris.agglo.paris	18.04	65 45.59	3 9.75	67 2.11	8 14.40	142 46.94
ENSEMBLE	100.00	359 39.99	31 100.00	462 3.42	45 100.00	896 51.57

CHI2 = 16.57 / 6 DEGRES DE LIBERTE / 1 EFFECTIFS THEORIQUES INFERIEURS A 5 / PROBA (CHI2 > 16.57) = 0.011 / V.TEST = 2.25

TABLEAU 39 EN LIGNE : taille d'agglomération
EN COLONNE : 112b - combien en buvez vous, en moyenne, par repas ? POIDS TOTAL : 397.

sexe de l'enquêté(e)		= masculin				ENSEMBLE
% COLONNE	POIDS % LIGNE	un litre ou plus	1/2 litre	1/4 litre	moins d'un 1/4 l.	
moins de 2000	17.40	1 1.16	21 26.25	55 16.10	51 32.07	126 43.06
plus de 2000	56.82	5 2.43	45 56.70	86 22.41	64 49.61	199 42.94
Paris.agglo.paris	25.78	2 3.18	13 17.04	32 19.40	22 18.32	69 45.66
ENSEMBLE	100.00	9 2.15	79 100.00	172 19.84	137 43.45	397 34.55

CHI2 = 4.13 / 6 DEGRES DE LIBERTE / 3 EFFECTIFS THEORIQUES INFERIEURS A 5 / PROBA (CHI2 > 4.13) = 0.659 / V.TEST = -0.41

POIDS TOTAL : 996.

TABLEAU 40 EN LIGNE : taille d'agglomération
EN COLONNE : 111a - buvez vous des apéritifs ou des alcools

		sexe de l'enquêté(e)					ENSEMBLE					
		= féminin										
% COLONNE	POIDS % LIGNE	tous les	plus. fois/	une fois /	moins 1 fois	Jamais						
		jours	semaine	semaine	/mois							
moins de 2000	4.19 ⁰	0.13	20.67 ¹¹	4.06	27.67 ⁵¹	18.56	30.81 ¹⁰⁹	25.66 ¹⁰³	37.51	27.41 ²⁷³	100.00	
plus de 2000	80.99 ⁷	1.19	62.21 ³⁴	5.84	60.33 ¹¹¹	19.25	52.46 ¹⁸⁵	32.19	59.80 ²³⁹	41.54	57.62 ⁵⁷⁵	100.00
paris.appl.o.paris	14.83 ¹	0.84	17.12 ⁹	6.18	11.99 ²²	14.72	16.71 ⁵⁹	39.45	14.51 ⁵⁶	36.81	14.97 ¹⁴⁹	100.00
ENSEMBLE	100.00 ⁶	0.84	100.00 ⁵⁴	5.41	100.00 ¹⁸³	18.36	100.00 ³⁵³	35.34	100.00 ³⁹⁹	40.03	100.00 ⁹⁹⁸	100.00

CHI2 = 9.66 / 8 DEGRES DE LIBERTE / 3 EFFECTIFS THEORIQUES INFERIEURS A 5 / PROBA (CHI2 > 9.68) = 0.286 / V.TEST = 0.56

POIDS TOTAL : 999.

TABLEAU 41 EN LIGNE : taille d'agglomération
EN COLONNE : 112a - au repas, que buvez vous de préférence ?

		sexe de l'enquêté(e)				ENSEMBLE				
		= féminin								
% COLONNE	POIDS % LIGNE	du vin	de la bière	de l'eau	autre					
		moins de 2000	24.61 ³⁵	12.63	5.42 ⁰		0.18	27.89 ²²¹	80.88	30.53 ¹⁷
plus de 2000	58.21 ⁸²	14.19	49.42 ⁴	0.76	57.65 ⁴⁵⁷	79.39	57.65 ³³	5.66	57.66 ⁵⁷⁶	100.00
paris.appl.o.paris	17.17 ²⁴	16.14	45.16 ⁴	2.68	14.45 ¹¹⁵	76.71	11.82 ⁷	4.48	14.96 ¹⁴⁹	100.00
ENSEMBLE	100.00 ¹⁴⁰	14.05	100.00 ⁹	0.89	100.00 ⁷⁹³	79.40	100.00 ⁵⁷	5.66	100.00 ⁹⁹⁹	100.00

CHI2 = 8.71 / 6 DEGRES DE LIBERTE / 2 EFFECTIFS THEORIQUES INFERIEURS A 5 / PROBA (CHI2 > 6.71) = 0.191 / V.TEST = 0.86

POIDS TOTAL : 171.

TABLEAU 42 EN LIGNE : taille d'agglomération
EN COLONNE : 112b - combien en buvez vous, en moyenne, par repas ?

		sexe de l'enquêté(e)				ENSEMBLE				
		= féminin								
% COLONNE	POIDS % LIGNE	un litre ou	1/2 litre	1/4 litre	moins d'un					
		plus			1/4 l.					
moins de 2000	20.33 ²	4.99	29.66 ³	5.99	19.65 ⁷	16.14	26.50 ³¹	72.89	24.86 ⁴³	100.00
plus de 2000	52.41 ⁵	5.47	56.39 ⁵	4.84	41.26 ¹⁴	14.42	64.33 ⁷⁵	75.27	58.49 ¹⁰⁰	100.00
paris.appl.o.paris	27.25 ³	10.01	13.95 ¹	4.21	39.09 ¹⁴	48.04	9.17 ¹¹	37.73	16.63 ²⁸	100.00
ENSEMBLE	100.00 ¹⁰	6.11	100.00 ⁹	5.02	100.00 ³⁵	20.44	100.00 ¹¹⁷	68.43	100.00 ¹⁷¹	100.00

CHI2 = 18.49 / 6 DEGRES DE LIBERTE / 4 EFFECTIFS THEORIQUES INFERIEURS A 5 / PROBA (CHI2 > 18.49) = 0.005 / V.TEST = 2.57

TABLEAU 43 EN LIGNE : région où habite l'enquêté(e) POIDS TOTAL : 896.
 EN COLONNE : 111a - buvez vous des apéritifs ou des alcools

sexe de l'enquêté(e)		= masculin					ENSEMBLE
% COLONNE	POIDS % LIGNE	tous les jours	plus. fois/ semaine	une fois / semaine	moins 1 fois /mois	jamais	
région paris	17.95 ⁷ 4.32	22.89 ³⁴ 20.09	16.62 ⁴⁵ 26.98	20.13 ⁵³ 31.66	16.49 ²⁸ 16.95	18.72 ¹⁶⁸ 100.00	
bassin parisien	15.64 ⁶ 4.10	17.18 ²⁵ 16.44	20.90 ⁵⁷ 36.99	17.57 ⁴⁶ 30.12	11.03 ¹⁹ 12.35	17.17 ¹⁵⁴ 100.00	
nord	14.24 ⁶ 9.09	6.75 ¹⁰ 15.73	7.59 ²¹ 32.74	3.75 ¹⁰ 15.64	9.82 ¹⁷ 26.80	7.05 ⁶³ 100.00	
est	15.92 ⁶ 7.67	3.19 ⁵ 5.62	10.78 ²⁹ 35.11	7.78 ²¹ 24.55	13.12 ²³ 27.04	9.33 ⁸⁴ 100.00	
ouest	3.97 ² 1.25	17.94 ²⁶ 20.65	14.66 ⁴⁰ 31.22	16.67 ⁴⁴ 34.36	9.27 ¹⁶ 12.50	14.27 ¹²⁸ 100.00	
sud-ouest	9.58 ⁴ 4.22	13.20 ¹⁹ 21.27	9.05 ²⁵ 26.97	8.39 ²² 24.22	12.37 ²¹ 23.33	10.20 ⁹¹ 100.00	
centre est	6.63 ³ 2.59	11.00 ¹⁶ 15.67	12.73 ³⁵ 33.54	11.96 ³² 30.50	10.62 ¹⁸ 17.71	11.54 ¹⁰³ 100.00	
méditerranée	16.07 ⁶ 6.17	7.84 ¹² 11.00	7.66 ²¹ 19.88	13.75 ³⁶ 34.56	17.28 ³⁰ 26.39	11.71 ¹⁰⁵ 100.00	
ENSEMBLE	100.00 ⁴⁰ 4.50	100.00 ¹⁴⁷ 16.43	100.00 ²⁷² 30.39	100.00 ²⁶⁴ 29.44	100.00 ¹⁷² 19.24	100.00 ⁸⁹⁶ 100.00	

CHI2 = 54.72 / 26 DEGRES DE LIBERTE / 5 EFFECTIFS THEORIQUES INFERIEURS A 5 / PROBA (CHI2 > 54.72) = 0.002 / V.TEST = 2.90

TABLEAU 44 EN LIGNE : région où habite l'enquêté(e) POIDS TOTAL : 896.
 EN COLONNE : 112a - au repas, que buvez vous de préférence ?

sexe de l'enquêté(e)		= masculin				ENSEMBLE
% COLONNE	POIDS % LIGNE	du vin	de la bière	de l'eau	autre	
région paris	21.89 ⁷⁶ 46.76	13.56 ⁴ 2.48	16.77 ⁷⁸ 46.22	16.96 ⁸ 4.54	18.72 ¹⁶⁸ 100.00	
bassin parisien	11.90 ⁴³ 27.72	25.81 ⁶ 5.14	20.15 ⁹³ 60.51	22.70 ¹⁰ 6.62	17.17 ¹⁵⁴ 100.00	
nord	5.04 ¹⁸ 26.58	26.72 ⁹ 13.94	7.42 ³⁴ 54.27	4.51 ² 3.21	7.05 ⁶³ 100.00	
est	6.60 ³¹ 36.85	13.15 ⁴ 4.82	8.39 ³⁹ 46.34	22.33 ¹⁰ 11.99	9.33 ⁸⁴ 100.00	
ouest	15.05 ⁵⁴ 42.18	14.07 ⁴ 3.37	12.96 ⁶⁰ 46.83	21.71 ¹⁰ 7.62	14.27 ¹²⁸ 100.00	
sud-ouest	14.11 ⁵¹ 55.32	1.87 ¹ 0.63	8.30 ³⁸ 41.95	4.29 ² 2.11	10.20 ⁹¹ 100.00	
centre est	10.12 ³⁶ 35.06	0.00 ⁰ 0.00	14.53 ⁶⁷ 64.94	0.00 ⁰ 0.00	11.54 ¹⁰³ 100.00	
méditerranée	13.29 ⁴⁸ 45.39	2.82 ¹ 0.82	11.49 ⁵³ 50.59	7.49 ³ 3.21	11.71 ¹⁰⁵ 100.00	
ENSEMBLE	100.00 ³⁵⁹ 39.99	100.00 ³¹ 3.42	100.00 ⁴⁶² 51.57	100.00 ⁴⁵ 5.01	100.00 ⁸⁹⁶ 100.00	

CHI2 = 75.50 / 21 DEGRES DE LIBERTE / 9 EFFECTIFS THEORIQUES INFERIEURS A 5 / PROBA (CHI2 > 75.50) = 0.000 / V.TEST = 5.35

TABLEAU 45 EN LIGNE : région où habite l'enquêté(e) POIDS TOTAL : 397.
 EN COLONNE : 112b - combien en buvez vous, en moyenne, par repas ?

		sexe de l'enquêté(e)				= masculin			
% COLONNE	POIDS % LIGNE	un litre ou plus		1/2 litre	1/4 litre	moins d'un 1/4 l.		ENSEMBLE	
		région paris	25.76	2	15	41	26	84	21.20
		2.61	18.11	23.77	48.72	30.56			
bassin parisien	0.00	0	9	26	18	53	13.47	100.00	
		0.00	17.34	15.21	49.06	33.58			
nord	0.00	0	6	13	7	27	6.77	100.00	
		0.00	22.29	7.79	49.99	27.72			
est	12.35	1	4	15	13	34	8.47	100.00	
		3.14	11.10	8.92	45.76	40.01			
ouest	31.41	3	12	26	21	62	15.65	100.00	
		4.32	19.37	15.35	42.63	33.69			
sud-ouest	13.07	1	12	26	12	51	12.89	100.00	
		2.18	23.16	15.25	51.41	23.25			
centre est	17.40	1	8	9	16	36	9.14	100.00	
		4.10	21.02	5.32	25.29	49.59			
méditerranée	0.00	0	13	14	22	49	12.41	100.00	
		0.00	26.44	6.39	29.37	44.19			
ENSEMBLE	100.00	9	79	172	137	397	100.00	100.00	
		2.15	19.64	100.00	43.45	34.55			

CHI2 = 21.74 / 21 DEGRES DE LIBERTE / 8 EFFECTIFS THEORIQUES INFERIEURS A 5 / PROBA (CHI2 > 21.74) = 0.415 / V.TEST = 0.22

TABLEAU 46 EN LIGNE : région où habite l'enquêté(e) POIDS TOTAL : 996.
 EN COLONNE : 111a - buvez vous des apéritifs ou des alcools

		sexe de l'enquêté(e)				= féminin			
% COLONNE	POIDS % LIGNE	tous les jours	plus. fois/ semaine	une fois / semaine	moins 1 fois / mois	jamais	ENSEMBLE		
		région paris	14.83	1	11	26	73	71	182
		0.69	6.17	13.94	14.04	40.23	36.86		
bassin parisien	13.97	1	8	39	68	62	176	100.00	
		0.66	4.44	21.21	21.84	38.29	34.76		
nord	19.32	2	9	23	11	21	66	100.00	
		2.46	13.85	12.79	35.41	16.22	32.07		
est	9.74	1	3	16	32	33	84	100.00	
		0.98	3.21	8.78	19.13	37.94	38.75		
ouest	8.54	1	4	26	52	51	136	100.00	
		0.53	3.23	15.37	20.70	38.07	37.47		
sud-ouest	0.00	0	3	16	47	53	119	100.00	
		0.00	2.64	8.87	13.65	39.26	44.45		
centre est	4.19	0	7	14	41	47	109	100.00	
		0.32	6.50	7.86	13.16	37.24	42.78		
méditerranée	29.41	2	8	21	29	62	122	100.00	
		2.03	6.76	11.18	16.76	23.79	50.65		
ENSEMBLE	100.00	6	54	183	353	399	996	100.00	
		0.84	5.41	100.00	18.38	95.34	40.03		

CHI2 = 57.45 / 28 DEGRES DE LIBERTE / 10 EFFECTIFS THEORIQUES INFERIEURS A 5 / PROBA (CHI2 > 57.45) = 0.001 / V.TEST = 3.14

TABLEAU 47 EN LIGNE : région où habite l'enquêté(e) POIDS TOTAL : 999.
 EN COLONNE : 112a - au repas, que buvez vous de préférence ?

sexe de l'enquêté(e)		= féminin				ENSEMBLE
% COLONNE	POIDS % LIGNE	du vin	de la bière	de l'eau	autre	
région paris	18.02 ²⁵ 13.89	45.16 ⁴ 2.19	16.13 ¹⁴⁴ 78.94	16.01 ⁹ 4.97	18.23 ¹⁸² 100.00	
bassin parisien	10.87 ¹⁵ 8.52	0.00 ⁰ 0.00	19.11 ¹⁵² 84.62	21.75 ¹² 6.87	17.93 ¹⁷⁹ 100.00	
nord	4.18 ⁶ 8.86	25.34 ² 3.39	7.20 ⁵⁷ 86.20	1.82 ¹ 1.55	6.63 ⁶⁶ 100.00	
est	6.26 ⁹ 10.45	5.71 ¹ 0.60	8.67 ⁶⁹ 81.70	10.78 ⁶ 7.25	8.42 ⁸⁴ 100.00	
ouest	16.44 ²³ 16.95	0.00 ⁰ 0.00	12.38 ⁹⁸ 72.11	26.36 ¹⁵ 10.95	13.64 ¹³⁶ 100.00	
sud-ouest	10.66 ¹⁵ 12.55	10.09 ¹ 0.75	12.50 ⁹⁹ 83.14	7.52 ⁴ 3.57	11.94 ¹¹⁹ 100.00	
centre est	12.30 ¹⁷ 15.77	13.71 ¹ 1.11	10.76 ⁸⁵ 77.95	10.02 ⁶ 5.18	10.96 ¹⁰⁹ 100.00	
méditerranée	21.27 ³⁰ 24.42	0.00 ⁰ 0.00	11.24 ⁸⁹ 72.93	5.73 ³ 2.65	12.24 ¹²² 100.00	
ENSEMBLE	100.00 ¹⁴⁰ 14.05	100.00 ⁹ 0.89	100.00 ⁷⁹³ 79.40	100.00 ⁵⁷ 5.66	100.00 ⁹⁹⁹ 100.00	

CHI2 = 44.22 / 21 DEGRES DE LIBERTE / 10 EFFECTIFS THEORIQUES INFERIEURS A 5 / PROBA (CHI2 > 44.22) = 0.002 / V.TEST = 2.85

TABLEAU 48 EN LIGNE : région où habite l'enquêté(e) POIDS TOTAL : 171.
 EN COLONNE : 112b - combien en buvez vous, en moyenne, par repas ?

sexe de l'enquêté(e)		= féminin				ENSEMBLE
% COLONNE	POIDS % LIGNE	un litre ou plus	1/2 litre	1/4 litre	moins d'un 1/4 l.	
région paris	27.25 ³ 9.61	13.95 ¹ 4.05	42.46 ¹⁵ 50.12	9.17 ¹¹ 36.23	17.32 ³⁰ 100.00	
bassin parisien	17.38 ² 8.38	11.06 ¹ 4.39	11.79 ⁴ 19.01	12.63 ¹⁵ 68.23	12.67 ²² 100.00	
nord	0.00 ⁰ 0.00	0.00 ⁰ 0.00	11.21 ⁴ 46.67	3.82 ⁴ 53.33	4.91 ⁸ 100.00	
est	0.00 ⁰ 0.00	5.87 ¹ 5.43	1.94 ¹ 7.31	6.92 ⁸ 87.25	5.43 ⁹ 100.00	
ouest	29.26 ³ 9.76	30.51 ³ 8.37	13.81 ⁵ 15.41	17.78 ²¹ 66.46	18.31 ³¹ 100.00	
sud-ouest	12.83 ¹ 7.36	0.00 ⁰ 0.00	3.02 ¹ 5.80	13.52 ¹⁶ 86.85	10.66 ¹⁸ 100.00	
centre est	0.00 ⁰ 0.00	23.41 ² 10.06	6.67 ³ 15.19	12.74 ¹⁵ 74.74	11.66 ²⁰ 100.00	
méditerranée	13.28 ¹ 4.26	15.17 ¹ 4.00	7.09 ² 7.60	23.41 ²⁷ 84.13	19.04 ³³ 100.00	
ENSEMBLE	100.00 ¹⁰ 6.11	100.00 ⁹ 5.02	100.00 ³⁵ 20.44	100.00 ¹¹⁷ 68.43	100.00 ¹⁷¹ 100.00	

CHI2 = 36.28 / 21 DEGRES DE LIBERTE / 21 EFFECTIFS THEORIQUES INFERIEURS A 5 / PROBA (CHI2 > 36.28) = 0.020 / V.TEST = 2.05

TABLEAU 49 EN LIGNE : âge * sexe de l'enquêté(e) POIDS TOTAL : 1890.
 EN COLONNE : 113 - combien fumez vous de cigarettes par jour, en moyenne

% COLONNE	POIDS % LIGNE	sexe de l'enquêté(e)				ENSEMBLE
		plus de 20	10 à 20	moins de 10	ne fume pas	
24 et moins hommes	7.51 ¹³ 9.41	11.80 ³⁷ 27.15	11.06 ²¹ 15.80	5.29 ⁶⁴ 47.64	7.15 ¹³⁵ 100.00	
25 à 39 ans hommes	36.63 ⁶² 19.66	26.73 ⁸³ 26.36	16.37 ³² 10.03	11.37 ¹³⁸ 43.92	16.67 ³¹⁵ 100.00	
40 à 59 ans hommes	16.06 ²⁷ 10.43	15.69 ⁴⁹ 16.72	11.85 ²³ 8.80	13.25 ¹⁶² 62.05	13.78 ²⁶¹ 100.00	
60 et plus hommes	6.05 ¹⁰ 5.67	6.23 ¹⁹ 10.71	11.45 ²² 12.23	10.60 ¹²⁹ 71.39	9.56 ¹⁸¹ 100.00	
24 et moins femmes	7.25 ¹² 9.65	13.14 ⁴¹ 32.15	6.47 ¹² 9.82	5.05 ⁶¹ 48.36	6.72 ¹²⁷ 100.00	
25 à 39 ans femmes	16.81 ²⁶ 8.86	19.27 ⁶⁰ 16.66	24.96 ⁴⁶ 15.00	15.16 ¹⁸⁵ 57.49	16.99 ³²¹ 100.00	
40 à 59 ans femmes	9.09 ¹⁵ 5.66	5.10 ¹⁶ 5.84	14.19 ²⁷ 10.10	17.46 ²¹² 76.36	14.34 ²⁷¹ 100.00	
60 et plus femmes	0.61 ¹ 0.37	2.05 ⁶ 2.28	3.62 ⁷ 2.50	21.80 ²⁶⁵ 94.86	14.80 ²⁸⁰ 100.00	
ENSEMBLE	100.00 ¹⁶⁹ 6.95	100.00 ³¹¹ 16.45	100.00 ¹⁹³ 10.21	100.00 ¹²¹⁷ 64.39	100.00 ¹⁸⁹⁰ 100.00	

CHI2 = 287.94 / 21 DEGRES DE LIBERTE / 0 EFFECTIFS THEORIQUES INFERIEURS A 5 / PROBA (CHI2 > 287.94) = 0.000 / V.TEST = 14.63

TABLEAU 50 EN LIGNE : situation actuelle de la personne interrogée POIDS TOTAL : 891.
 EN COLONNE : 113 - combien fumez vous de cigarettes par jour, en moyenne

% COLONNE	POIDS % LIGNE	sexe de l'enquêté(e)				ENSEMBLE
		plus de 20	10 à 20	moins de 10	ne fume pas	
actif	61.59 ⁶⁹ 12.18	65.23 ¹²⁵ 22.61	63.50 ⁶² 10.97	62.34 ³⁰⁸ 54.24	63.62 ⁵⁶⁷ 100.00	
étudiant	7.71 ⁹ 12.99	7.10 ¹³ 20.06	9.54 ⁹ 14.06	7.13 ³⁵ 52.89	7.46 ⁶⁶ 100.00	
ménagère s.prof.	0.00 ⁰ 0.00	0.00 ⁰ 0.00	1.42 ¹ 44.11	0.36 ² 55.89	0.35 ³ 100.00	
malade invalide	3.98 ⁴ 24.37	4.42 ⁸ 45.40	1.10 ¹ 5.88	0.90 ⁴ 24.36	2.05 ¹⁸ 100.00	
retraité	10.44 ¹² 6.69	9.91 ¹⁹ 10.65	19.49 ¹⁹ 10.91	25.44 ¹²⁵ 71.75	19.62 ¹⁷⁵ 100.00	
chomeur	16.29 ¹⁶ 29.73	10.34 ¹⁹ 31.64	4.95 ⁵ 7.90	3.82 ¹⁹ 30.73	6.89 ⁶¹ 100.00	
ENSEMBLE	100.00 ¹¹² 12.58	100.00 ¹⁸⁶ 21.08	100.00 ⁹⁸ 10.99	100.00 ⁴⁹³ 55.35	100.00 ⁸⁹¹ 100.00	

CHI2 = 63.72 / 15 DEGRES DE LIBERTE / 7 EFFECTIFS THEORIQUES INFERIEURS A 5 / PROBA (CHI2 > 63.72) = 0.000 / V.TEST = 5.30

TABLEAU 51 EN LIGNE : situation actuelle de la personne interrogée POIDS TOTAL : 999.
 EN COLONNE : 113 - combien fumez vous de cigarettes par jour, en moyenne

sexe de l'enquêté(e)		= féminin				ENSEMBLE
% COLONNE	POIDS % LIGNE	plus de 20	10 à 20	moins de 10	ne fume pas	
actif	55.66 ³² 8.53	41.78 ⁵¹ 13.79	52.97 ⁵⁰ 13.51	33.03 ²³⁹ 64.17	37.29 ³⁷² 100.00	
étudiant	0.64 ⁰ 0.80	10.86 ¹³ 29.33	2.40 ² 5.01	4.08 ³⁰ 64.86	4.56 ⁴⁶ 100.00	
ménagère s.prof.	28.34 ¹⁶ 5.51	26.23 ³² 10.96	26.27 ²⁵ 8.49	30.46 ²²⁰ 75.02	29.42 ²⁹⁴ 100.00	
malade invalide	2.39 ¹ 7.26	1.31 ² 8.57	3.17 ³ 15.99	1.77 ¹³ 68.18	1.88 ¹⁹ 100.00	
retraité	1.37 ¹ 0.36	5.18 ⁶ 3.13	6.32 ⁶ 2.95	26.31 ¹⁹⁰ 93.54	20.38 ²⁰⁴ 100.00	
chomeur	11.59 ⁷ 10.25	14.64 ¹⁸ 27.88	6.86 ⁸ 13.04	4.36 ³² 48.83	6.46 ⁶⁵ 100.00	
ENSEMBLE	100.00 ⁵⁷ 5.72	100.00 ¹²³ 12.31	100.00 ⁹⁵ 9.51	100.00 ⁷²⁴ 72.46	100.00 ⁹⁹⁹ 100.00	

CHI2 = 96.42 / 15 DEGRES DE LIBERTE / 6 EFFECTIFS THEORIQUES INFERIEURS A 5 / PROBA (CHI2 > 96.42) = 0.000 / V.TEST = 7.53

TABLEAU 52 EN LIGNE : catégorie socio-professionnelle (9 postes) POIDS TOTAL : 891.
 EN COLONNE : 113 - combien fumez vous de cigarettes par jour, en moyenne

sexe de l'enquêté(e)		= masculin				ENSEMBLE
% COLONNE	POIDS % LIGNE	plus de 20	10 à 20	moins de 10	ne fume pas	
exploitant agricole	1.75 ² 4.47	2.26 ⁴ 9.67	6.21 ⁶ 13.87	6.40 ³² 72.00	4.92 ⁴⁴ 100.00	
ouv.agr/ser/ouvriers	42.25 ⁴⁷ 17.58	44.05 ⁸⁵ 30.72	26.54 ²⁶ 9.65	22.97 ¹¹³ 42.06	30.23 ²⁶⁹ 100.00	
art.comm. chef ent	2.92 ³ 6.53	4.45 ⁸ 16.67	4.76 ⁵ 9.29	6.87 ³⁴ 67.50	5.63 ⁵⁰ 100.00	
cadre.prof. int.sup.	7.36 ⁸ 14.66	4.35 ⁸ 14.48	5.25 ⁵ 9.11	7.06 ⁹⁵ 61.75	6.33 ⁵⁶ 100.00	
profession interm.	13.26 ¹⁵ 12.13	12.24 ²³ 18.76	12.33 ¹² 9.86	14.72 ⁷³ 59.26	13.75 ¹²³ 100.00	
employé	11.48 ¹³ 15.53	10.41 ²⁰ 23.62	13.35 ¹³ 15.79	7.57 ³⁷ 45.07	9.30 ⁸³ 100.00	
étudiant	6.54 ⁷ 11.25	7.10 ¹³ 20.46	9.54 ⁹ 14.34	7.13 ³⁵ 53.95	7.31 ⁶⁵ 100.00	
ménagère aut.ina.	3.98 ⁴ 17.27	5.23 ¹⁰ 38.09	2.52 ² 9.56	1.84 ⁹ 35.08	2.90 ²⁶ 100.00	
retraité	10.44 ¹² 6.69	9.91 ¹⁹ 10.65	19.49 ¹⁹ 10.91	25.44 ¹²⁵ 71.75	19.62 ¹⁷⁵ 100.00	
ENSEMBLE	100.00 ¹¹² 12.56	100.00 ¹⁸⁶ 21.08	100.00 ⁹⁸ 10.99	100.00 ⁴⁹³ 55.35	100.00 ⁸⁹¹ 100.00	

CHI2 = 73.20 / 24 DEGRES DE LIBERTE / 3 EFFECTIFS THEORIQUES INFERIEURS A 5 / PROBA (CHI2 > 73.20) = 0.000 / V.TEST = 4.82

TABLEAU 53 EN LIGNE : catégorie socio-professionnelle (9 postes) POIDS TOTAL : 999.
 EN COLONNE : 113 - combien fumez vous de cigarettes par jour, en moyenne

sexe de l'enquêté(e)		= féminin				
% COLONNE	POIDS	plus de 20	10 à 20	moins de 10	ne fume pas	ENSEMBLE
	% LIGNE					
exploitant agricole	3.96 ²	7.62	0.00 ⁰	1.05 ¹	3.67 ²⁷	2.99 ³⁰
			0.00	3.33	89.05	100.00
ouv.agr/ser/ouvriers	17.78 ¹⁰	10.22	12.82 ¹⁶	13.62 ¹³	6.35 ⁶⁰	9.94 ⁹⁹
			15.87	13.03	60.88	100.00
art.comm. chef ent	2.21 ¹	3.50	3.61 ⁴	4.96 ⁵	3.54 ²⁶	3.61 ³⁶
			12.31	13.12	71.07	100.00
cadre.prof. int.sup.	2.10 ¹	4.09	4.07 ⁵	7.22 ⁷	2.25 ¹⁶	2.94 ²⁹
			17.05	23.37	55.50	100.00
profession interr.	7.49 ⁴	6.47	9.66 ¹²	11.22 ¹¹	5.43 ³⁹	6.62 ⁶⁶
			16.00	16.13	59.40	100.00
employé	33.71 ¹⁹	11.19	24.86 ³¹	23.75 ²³	13.76 ¹⁰⁰	17.21 ¹⁷²
			17.77	13.12	57.91	100.00
étudiant	0.64 ⁰	0.79	11.60 ¹⁴	2.40 ²	4.08 ³⁰	4.65 ⁴⁶
			30.70	4.91	63.60	100.00
ménagère aut.1na.	30.73 ¹⁸	5.55	26.20 ³⁵	29.44 ²⁸	32.61 ²³⁶	31.66 ³¹⁶
			10.96	8.84	74.64	100.00
retraité	1.37 ¹	0.36	5.16 ⁶	6.32 ⁶	26.31 ¹⁹⁰	20.38 ²⁰⁴
			3.13	2.95	93.54	100.00
ENSEMBLE	100.00 ⁵⁷	5.72	100.00 ¹²³	100.00 ⁹⁵	100.00 ⁷²⁴	100.00 ⁹⁹⁹
			12.31	9.51	72.46	100.00

CHI2 = 112.29 / 24 DEGRES DE LIBERTE / 12 EFFECTIFS THEORIQUES INFERIEURS A 5 / PROBA (CHI2 > 112.29) = 0.000 / V.TEST = 7.24

TABLEAU 54 EN LIGNE : 52 - zone où se trouve l'habitation POIDS TOTAL : 891.
 EN COLONNE : 113 - combien fumez vous de cigarettes par jour, en moyenne

sexe de l'enquêté(e)		= masculin				
% COLONNE	POIDS	plus de 20	10 à 20	moins de 10	ne fume pas	ENSEMBLE
	% LIGNE					
en centre ville	35.05 ³⁹	12.80	33.83 ⁶⁴	42.67 ⁴²	32.90 ¹⁶²	34.44 ³⁰⁷
			20.71	13.62	52.87	100.00
périphérie banlieue	40.93 ⁴⁶	16.95	37.31 ⁷⁰	23.07 ²³	26.75 ¹³²	30.37 ²⁷¹
			25.90	8.35	48.80	100.00
village bourg	19.70 ²²	9.66	21.19 ⁴⁰	29.04 ²⁶	28.04 ¹³⁸	25.66 ²²⁹
			17.41	12.44	60.49	100.00
habitat dispersé	4.32 ⁵	5.70	7.67 ¹⁴	5.22 ⁵	12.25 ⁶¹	9.53 ⁸⁵
			16.97	6.01	71.32	100.00
ENSEMBLE	100.00 ¹¹²	12.58	100.00 ¹⁸⁸	100.00 ⁹⁸	100.00 ⁴⁹³	100.00 ⁸⁹¹
			21.08	10.99	55.35	100.00

CHI2 = 27.46 / 9 DEGRES DE LIBERTE / 0 EFFECTIFS THEORIQUES INFERIEURS A 5 / PROBA (CHI2 > 27.46) = 0.001 / V.TEST = 3.04

TABLEAU 55 EN LIGNE : S2 - zone où se trouve l'habitation
EN COLONNE : I13 - combien fumez vous de cigarettes par jour, en moyenne POIDS TOTAL : 996.

sexe de l'enquêté(e)		= féminin				
POIDS % COLONNE	% LIGNE	plus de 20	10 à 20	moins de 10	ne fume pas	ENSEMBLE
er centre ville	35.82 ²⁰	41.67 ⁵¹	34.40 ³³	36.34 ²⁶³	36.78 ³⁶⁷	100.00
dépendante banlieue	39.66 ²³	32.07 ³⁹	34.86 ³³	27.43 ¹⁹⁶	29.41 ²⁹³	100.00
village bourg	13.36 ⁸	19.46 ²⁴	24.59 ²³	27.97 ²⁰²	25.76 ²⁵⁷	100.00
habitat dispersé	11.16 ⁶	6.80 ⁶	6.14 ⁶	8.27 ⁶⁰	8.05 ⁸⁰	100.00
ENSEMBLE	100.00 ⁵⁷	100.00 ¹²³	100.00 ⁹⁵	100.00 ⁷²³	100.00 ⁹⁹⁶	100.00

CHI2 = 13.36 / 9 DEGRES DE LIBERTE / 1 EFFECTIFS THEORIQUES INFERIEURS A 5 / PROBA (CHI2 > 13.36) = 0.146 / V.TEST = 1.05

TABLEAU 56 EN LIGNE : taille d'agglomération
EN COLONNE : I13 - combien fumez vous de cigarettes par jour, en moyenne POIDS TOTAL : 891.

sexe de l'enquêté(e)		= masculin				
POIDS % COLONNE	% LIGNE	plus de 20	10 à 20	moins de 10	ne fume pas	ENSEMBLE
moins de 2000	16.04 ¹⁸	22.17 ⁴²	27.26 ²⁷	32.02 ¹⁵⁶	27.41 ²⁴⁴	100.00
plus de 2000	62.39 ⁷⁰	58.19 ¹⁰⁹	56.23 ⁵⁵	55.02 ²⁷¹	56.74 ⁵⁰⁶	100.00
Paris.agglo.paris	21.57 ²⁴	19.65 ³⁷	16.49 ¹⁶	12.97 ⁶⁴	15.84 ¹⁴¹	100.00
ENSEMBLE	100.00 ¹¹²	100.00 ¹⁸⁶	100.00 ⁹⁶	100.00 ⁴⁹³	100.00 ⁸⁹¹	100.00

CHI2 = 18.58 / 6 DEGRES DE LIBERTE / 0 EFFECTIFS THEORIQUES INFERIEURS A 5 / PROBA (CHI2 > 18.58) = 0.005 / V.TEST = 2.56

TABLEAU 57 EN LIGNE : taille d'agglomération
EN COLONNE : I13 - combien fumez vous de cigarettes par jour, en moyenne POIDS TOTAL : 999.

sexe de l'enquêté(e)		= féminin				
POIDS % COLONNE	% LIGNE	plus de 20	10 à 20	moins de 10	ne fume pas	ENSEMBLE
moins de 2000	22.17 ¹³	24.21 ³⁰	25.78 ²⁴	28.54 ²⁰⁷	27.38 ²⁷³	100.00
plus de 2000	57.44 ³³	60.75 ⁷⁵	52.48 ⁵⁰	57.83 ⁴¹⁹	57.66 ⁵⁷⁶	100.00
Paris.agglo.paris	20.39 ¹²	15.04 ¹⁸	21.74 ²¹	13.62 ⁹⁹	14.96 ¹⁴⁹	100.00
ENSEMBLE	100.00 ⁵⁷	100.00 ¹²³	100.00 ⁹⁵	100.00 ⁷²⁴	100.00 ⁹⁹⁹	100.00

CHI2 = 7.02 / 6 DEGRES DE LIBERTE / 0 EFFECTIFS THEORIQUES INFERIEURS A 5 / PROBA (CHI2 > 7.02) = 0.319 / V.TEST = 0.47

TABLEAU 58 EN LIGNE : E4 - avez vous été au chômage ces douze derniers mois ? POIDS TOTAL : 569.
 EN COLONNE : I13 - combien fumez vous de cigarettes par jour, en moyenne

sexe de l'enquêté(e)		= masculin				
POIDS % COLONNE	% LIGNE	plus de 20	10 à 20	moins de 10	ne fume pas	ENSEMBLE
oui -		13.86 ¹⁰ 16.41	8.96 ¹¹ 20.27	12.20 ⁸ 13.72	8.46 ²⁶ 47.60	9.67 ⁵⁵ 100.00
non -		86.12 ⁶³ 12.23	91.04 ¹¹³ 22.04	87.80 ⁵⁴ 10.57	91.54 ²⁸⁴ 55.16	90.33 ⁵¹⁴ 100.00
ENSEMBLE		100.00 ⁷³ 12.83	100.00 ¹²⁴ 21.87	100.00 ⁶² 10.86	100.00 ³¹⁰ 54.43	100.00 ⁵⁶⁹ 100.00

CHI2 = 2.53 / 3 DEGRES DE LIBERTE / 0 EFFECTIFS THEORIQUES INFERIEURS A 5 / PROBA (CHI2 > 2.53) = 0.471 / V.TEST = 0.07

TABLEAU 59 EN LIGNE : E4 - avez vous été au chômage ces douze derniers mois ? POIDS TOTAL : 368.
 EN COLONNE : I13 - combien fumez vous de cigarettes par jour, en moyenne

sexe de l'enquêté(e)		= féminin				
POIDS % COLONNE	% LIGNE	plus de 20	10 à 20	moins de 10	ne fume pas	ENSEMBLE
oui -		14.14 ⁴ 8.60	29.09 ¹⁵ 31.46	13.22 ⁷ 13.87	9.66 ²³ 46.06	13.32 ⁴⁹ 100.00
non -		85.86 ²⁶ 8.03	70.91 ³⁸ 11.79	86.78 ⁴⁵ 14.00	90.34 ²¹¹ 66.19	86.68 ³¹⁹ 100.00
ENSEMBLE		100.00 ³⁰ 8.10	100.00 ⁵³ 14.41	100.00 ⁵¹ 13.96	100.00 ²³⁴ 63.50	100.00 ³⁶⁸ 100.00

CHI2 = 14.13 / 3 DEGRES DE LIBERTE / 1 EFFECTIFS THEORIQUES INFERIEURS A 5 / PROBA (CHI2 > 14.13) = 0.003 / V.TEST = 2.76

TABLEAU 60 EN LIGNE : M3 - etes-vous inquiet du risque du chômage POIDS TOTAL : 891.
 EN COLONNE : I13 - combien fumez vous de cigarettes par jour, en moyenne

sexe de l'enquêté(e)		= masculin				
POIDS % COLONNE	% LIGNE	plus de 20	10 à 20	moins de 10	ne fume pas	ENSEMBLE
beaucoup		46.44 ⁵² 15.29	49.69 ⁹³ 27.44	31.67 ³¹ 9.12	33.22 ¹⁶⁴ 46.15	38.19 ³⁴⁰ 100.00
assez		22.41 ²⁵ 14.10	16.70 ³¹ 17.61	25.89 ²⁵ 14.23	19.53 ⁹⁶ 54.07	19.99 ¹⁷⁶ 100.00
un peu		22.53 ²⁵ 14.65	16.05 ³⁰ 17.49	19.97 ²⁰ 11.35	19.74 ⁹⁷ 56.51	19.34 ¹⁷² 100.00
pas du tout		8.62 ¹⁰ 4.82	17.56 ³³ 16.47	22.47 ²² 10.98	27.50 ¹³⁶ 67.72	22.48 ²⁰⁰ 100.00
ENSEMBLE		100.00 ¹¹² 12.58	100.00 ¹⁸⁸ 21.08	100.00 ⁹⁸ 10.99	100.00 ⁴⁹³ 55.35	100.00 ⁸⁹¹ 100.00

CHI2 = 34.73 / 9 DEGRES DE LIBERTE / 0 EFFECTIFS THEORIQUES INFERIEURS A 5 / PROBA (CHI2 > 34.73) = 0.000 / V.TEST = 3.82

TABLEAU 61 EN LIGNE : M3 - etes-vous inquiet du risque du chômage POIDS TOTAL : 999.
 EN COLONNE : I13 - combien fumez vous de cigarettes par jour, en moyenne

sexe de l'enquêté(e)		= féminin				
POIDS % COLONNE	% LIGNE	plus de 20	10 à 20	moins de 10	ne fume pas	ENSEMBLE
beaucoup		50.51 ²⁹ 6.60	46.58 ⁵⁷ 13.11	40.79 ³⁹ 8.87	43.09 ³¹² 71.41	43.72 ⁴³⁷ 100.00
assez		22.42 ¹³ 6.05	23.39 ²⁹ 13.59	21.38 ²⁰ 9.60	20.69 ¹⁵⁰ 70.77	21.19 ²¹² 100.00
un peu		22.40 ¹³ 8.69	16.64 ²⁰ 13.89	20.39 ¹⁹ 13.16	13.07 ⁹⁵ 64.26	14.74 ¹⁴⁷ 100.00
pas du tout		4.67 ³ 1.31	13.39 ¹⁶ 8.10	17.43 ¹⁷ 8.15	23.15 ¹⁶⁸ 82.44	20.35 ²⁰³ 100.00
ENSEMBLE		100.00 ⁵⁷ 5.72	100.00 ¹²³ 12.31	100.00 ⁹⁵ 9.51	100.00 ⁷²⁴ 72.46	100.00 ⁹⁹⁹ 100.00

CHI2 = 20.50 / 9 DEGRES DE LIBERTE / 0 EFFECTIFS THEORIQUES INFERIEURS A 5 / PROBA (CHI2 > 20.50) = 0.015 / V.TEST = 2.17

Collection
des rapports

Février 1988

N° 34



Sont récemment parus

- ▶ La crise de l'emploi dans des zones en restructuration industrielle (annexes au rapport), par E. Pascaud et B. Simonin, N° 29, Décembre 1987.
 - ▶ Le système d'enquêtes "Conditions de vie et aspirations des Français", Les effets de vieillissement sur les opinions et attitudes, par M. Grignon, N° 30, Octobre 1987.
 - ▶ La crise de l'emploi dans des zones en restructuration industrielle : impact des politiques de formation et d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes, par E. Pascaud et B. Simonin, N° 31, Décembre 1987.
 - ▶ Le système d'enquêtes "Conditions de vie et aspirations des Français", Les conditions de vie à travers le prisme des opinions - Les Français en décembre 1986, Equipe "Aspirations", N° 32, Février 1988.
 - ▶ Le système d'enquêtes "Conditions de vie et aspirations des Français", Image de l'enseignement artistique, culture, vie associative - Automne 1986 - Phase 9, par C. Duflos, N° 33, Février 1988.
- 