

# CRÉDOC

Enquête "Conditions de vie et Aspirations des Français"

Vague de fin 1993

Sou1994-888

## Prescription pharmaceutique et comportement du patient

Sou1994-888

Note réalisée à la demande de la  
Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMTS)

F. B.

Juillet 1994

Cote  
R8 0079

Enq. cond. de vie et asp. des Fr. -  
Vag. de fin 1993 - Prescription  
pharmaceutique et comportement du  
patient / Franck Berthuit. Juillet 1994.

hevaleret  
P A R I S

Num  
23451-1

CREDOC•Bibliothèque





Enquête "Conditions de vie et Aspirations des Français"

Vague de fin 1993

Prescription pharmaceutique  
et comportement du patient

Note réalisée à la demande de la  
Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMTS)

F. B.

Juillet 1994

142, rue du Chevaleret  
7 5 0 1 3 - P A R I S

## **CONDITIONS DE VIE ET ASPIRATIONS DES FRANCAIS**

**Le département "Conditions de vie et Aspirations des Français" est composé de :**

- . Georges Hatchuel (Directeur adjoint du CREDOC)
  
- . Franck Berthuit, Catherine Duflos, Ariane Dufour, Françoise Gros, Yves Hulot, Anne-Delphine Kowalski, Lucette Laurent.

### **C R E D O C**

Président : Bernard Schaefer  
Directeur : Robert Rochefort

## Avant-propos

Cette note présente les résultats des questions insérées, à la demande de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMTS), dans la vague de fin 1993 de l'enquête sur "les Conditions de vie et les Aspirations des Français".

Rappelons que l'enquête a été réalisée en face à face en décembre 1993 - janvier 1994, auprès d'un échantillon de 2001 personnes de nationalité française, âgées de 18 ans et plus, sélectionnées selon la méthode des quotas. Ceux-ci (région, taille d'agglomération, âge, sexe, PCS) ont été calculés d'après le dernier recensement. Afin d'assurer la représentativité par rapport à la population nationale, un redressement a été effectué à partir des variables suivantes : âge, sexe, PCS et taille d'agglomération<sup>1</sup>.

Les commentaires de la présente note sont présentés en deux parties :

- La première est consacrée au comportement du patient quant au respect du traitement prescrit par le médecin : plus d'un tiers des Français déclarent ne pas aller systématiquement jusqu'au bout du traitement prescrit.
- La seconde est relative à l'utilisation que les patients font des médicaments restants en leur possession à l'issue du traitement.

Sur ces deux points, les résultats présentés peuvent être, en partie, comparés à ceux obtenus sur ces mêmes sujets il y a un an.

Enfin, on trouvera en annexe le libellé précis des questions insérées dans l'enquête à la demande de la CNAMTS et une série de tableaux croisés relatifs aux résultats obtenus.

---

<sup>1</sup> Pour plus de précisions sur les caractéristiques techniques de l'enquête, on pourra se reporter au rapport intitulé : "Premiers résultats de la vague de fin 1993", Collection des Rapports du CREDOC, N° 144, Mars 1994.

## 1 - Un Français sur trois ne suit pas toujours son traitement

En fin 1993, plus d'un Français sur trois (36%) déclarent ne pas aller systématiquement jusqu'au bout du traitement prescrit par le médecin (tableau 1). Cette proportion est sensiblement équivalente à celle observée un an plus tôt. Précisons qu'il ne s'agit pas là d'un aveu d'arrêt systématique du traitement avant son terme, ce qui constituerait à l'évidence une marque importante de défiance vis-à-vis de la compétence du corps médical : ces Français n'arrêtent pas **tous** leurs traitements avant terme, mais ils les arrêtent **parfois** prématurément, et ceci, à leur discrétion.

Tableau 1  
**Quand un médecin vous prescrit un médicament, allez-vous systématiquement jusqu'au bout du traitement prescrit ?**

	En %	
	Décembre 1992	Décembre 1993
Oui .....	66,4	64,2
Non .....	33,6	35,6
Ne sait pas, non réponse.....	-	0,2
Ensemble de la population.....	100,0	100,0

Source : CREDOC

### Un comportement essentiellement fonction de l'âge ...

C'est en fonction de l'âge que les différences de comportement sur ce sujet apparaissent les plus importantes : **en vieillissant, les Français suivent de plus en plus leur traitement "à la lettre"**. Ainsi, avant 25 ans, à peine un jeune sur deux (49%) va systématiquement au bout de son traitement (tableau 2). Ce pourcentage semble d'ailleurs en baisse sensible depuis un an (- 7 points entre la fin 1992 et la fin 1993). Au-delà de 60 ans, plus de huit personnes sur dix (81%) vont toujours jusqu'à la fin du traitement.

La catégorie socioprofessionnelle est aussi très corrélée avec l'observance de la médication. Elle "reprend", en partie, à son compte l'effet d'âge indiqué ci-dessus, le groupe des étudiants et celui des retraités étant, en effet, très proches des moins de 25 ans et des plus de 60 ans. Mais la prise en compte de la profession montre par ailleurs

que trois catégories affichent une forte inobservance de la prescription : les artisans, commerçants et chefs d'entreprise, les employés, les ouvriers.

Les personnes les moins diplômées se confinent plus aisément dans le strict respect du traitement. Mais on ne note pas d'opposition entre diplômés et non-diplômés : il n'y a pas de tendance à une remise en cause croissante du traitement au fur et à mesure que le niveau d'études, et donc le niveau de connaissance, s'élève.

**Tableau 2**  
**Proportion d'individus allant systématiquement jusqu'au bout de leur traitement,**  
**selon quelques caractéristiques socio-démographiques**

	En %		
	Décembre 1992	Décembre 1993	Différence 1993-1992
<u>Age</u>			
24 ans et moins .....	55,2	48,6	- 7
25 à 39 ans .....	56,3	57,3	+ 1
40 à 59 ans .....	67,2	64,0	- 3
60 ans et plus .....	83,6	81,4	- 2
<u>Profession et catégorie sociale</u>			
Exploitant agricole .....	57,3	62,6	+ 5
Artisan, commerçant, chef d'entreprise.....	52,3	48,0	- 4
Cadre supérieur .....	63,5	62,8	- 1
Profession intermédiaire.....	60,6	62,1	+ 2
Employé .....	60,1	55,5	- 5
Ouvrier.....	55,1	57,1	+ 2
Etudiant.....	56,3	55,2	- 1
Retraité.....	83,6	80,2	- 3
Inactif .....	73,4	67,3	- 6
<u>Niveau d'études</u>			
Aucun diplôme ou le CEP .....	74,3	68,9	- 5
BEPC, Technique (inférieur au bac) .....	63,1	61,8	- 1
BAC, Technique (niveau bac) .....	60,0	60,3	-
Etudes supérieures .....	64,2	64,5	-
<b>Ensemble de la population .....</b>	<b>66,4</b>	<b>64,2</b>	<b>- 2</b>

Exemple de lecture : En décembre 1993, 48,6% des moins de 25 ans déclarent aller systématiquement jusqu'au bout de leur traitement, contre 55,2% en décembre 1992, soit -7 points en un an.

Source : CREDOC

### **... et dépendant des opinions sur sa santé, comme de ses capacités financières**

La reconnaissance de l'autorité du corps médical accentue l'observance du traitement. Ainsi, 74% des Français qui sont tout à fait d'accord avec l'idée que le maintien en bonne santé est l'affaire des médecins vont systématiquement au bout de leur traitement. Parmi ceux qui ne sont pas du tout d'accord avec cette idée, "seuls" 54% respectent entièrement la prescription (tableau 3).

L'automédication est d'ailleurs plus facilement exercée par les personnes qui ne souffrent pas d'handicap ou de maladie chronique et par celles qui sont satisfaites de leur état de santé. Les pathologies ponctuelles, apanage des plus jeunes, facilitent donc une certaine largesse d'appréciation quant à l'intérêt du traitement.

**Tableau 3**  
Proportion d'individus allant systématiquement jusqu'au bout de leur traitement,  
selon quelques caractéristiques d'opinions

	En %		
	Décembre 1992	Décembre 1993	Différence 1993-1992
<b>"Le maintien en bonne santé, c'est l'affaire des médecins"</b>			
Tout à fait d'accord .....	76,6	73,4	- 3
Assez d'accord .....	71,3	67,8	- 4
Pas très d'accord .....	63,4	64,7	+ 1
Pas du tout d'accord .....	57,5	54,4	- 3
<b>Souffre d'un handicap, d'une maladie chronique</b>			
Oui .....	75,8	73,8	- 2
Non .....	63,3	61,3	- 2
<b>S'impose régulièrement des restrictions</b>			
Oui, dont des restrictions sur les soins médicaux .....	58,2	51,1	- 7
Oui, mais pas sur les soins médicaux .....	63,4	63,4	-
Non .....	71,3	69,4	- 2
<b>Par rapport aux personnes de son âge, trouve sa santé :</b>			
Très satisfaisante .....	59,9	61,7	+ 2
Satisfaisante .....	67,5	64,3	- 3
Peu ou pas du tout satisfaisante .....	74,7	70,0	- 5
Ensemble de la population .....	66,4	64,2	- 2

**Exemple de lecture** : En décembre 1993, 73,8% des personnes souffrant d'un handicap ou d'une maladie chronique déclarent aller systématiquement jusqu'au bout de leur traitement, contre 75,8% en décembre 1992, soit -2 points en un an.

Source : CREDOC

Enfin, on remarquera qu'une certaine logique d'économie budgétaire semble aussi sous-tendre le fait de suivre ou de ne pas suivre son traitement jusqu'au bout : les individus qui déclarent se restreindre sur les soins médicaux sont moins nombreux (51%) à toujours respecter strictement la médication, et ceci nettement moins en 1993 qu'en 1992. Si la persistance des difficultés de la Sécurité Sociale impose des hausses du ticket modérateur (voire un surcoût à terme des "complémentaires" type mutuelle), on peut donc supposer que cela ne sera pas sans incidence négative sur le suivi des traitements.

Autre révélateur du fait que la non-observance des traitements semble aussi lié à des contraintes financières : on trouve les chômeurs ou les résidents en HLM parmi les catégories où la part de non-observants est la plus élevée (tableau 4). Il convient

cependant, pour l'instant, de n'émettre cette hypothèse qu'au conditionnel. En effet, on n'observe pas de tendance laissant apparaître une corrélation (négative) entre le nombre de non-observants et le revenu du ménage : les personnes disposant de faibles revenus ne sont pas plus enclines que les personnes aisées à ne pas suivre leur traitement jusqu'au bout.

**Tableau 4**  
**Catégories où la part de non-observants est significativement la plus élevée**  
 En %

Est âgé de moins de 25 ans.....	51,1
Appartient à la PCS : artisan, commerçant, chef d'entreprise .	50,3
Est actif et vit seul (sans conjoint) .....	46,4
Est au chômage.....	44,5
Appartient à la PCS : employé.....	44,0
Appartient à la PCS : ouvrier.....	42,9
Réside en HLM .....	42,4
Est âgé de 25 à 39 ans.....	42,3
♦ dont homme de 25 à 39 ans.....	43,5
Est locataire de son logement.....	41,1
<b>Ensemble de la population.....</b>	<b>35,6</b>

Source : CREDOC, fin 1993.

Exemple de lecture : 51 % des personnes de moins de 25 ans ne vont pas systématiquement jusqu'au bout du traitement prescrit par leur médecin, contre 36 % en moyenne chez l'ensemble des Français.

## 2 - Les surplus de médicaments : des pratiques très différentes selon les catégories

Que font les Français des médicaments qui leur restent à l'issue du traitement ? S'en servent-ils à nouveau, notamment sans prescription ? Pour tenter de répondre à ces interrogations, une question, identique à celle qui avait déjà été posée en fin 1992, a été soumise aux enquêtés cette année ("*Quand à l'issue de votre traitement, il vous reste encore quelques médicaments, qu'en faites-vous le plus souvent ?*"). Il reste que dans l'enquête de la fin 1992, "le retour à la pharmacie ou le don à des associations humanitaires" n'étaient pas inclus dans les modalités de réponses possibles à la question. L'importance des réponses spontanées faites en ce sens aux enquêteurs nous avaient pourtant incités alors à opérer un comptage a posteriori<sup>2</sup>; mais le pourcentage atteint (7%) minorait certainement la réalité de ces retours. Dans l'enquête de la fin 1993, cette modalité de réponse a donc été offerte aux enquêtés : elle a été choisie par près d'un tiers de la population. De fait, la liste des réponses possibles ayant changé, nous ne pouvons faire ici d'analyse comparative des résultats des deux vagues d'enquêtes.

Pour près d'un Français sur trois (31%), les surplus de médicaments sont donc, le plus souvent, ramenés à la pharmacie ou donnés à une association humanitaire (tableau 5). Plus d'un Français sur quatre (27%) les conservent et les réutilisent : 18% le font sans prescription médicale, 9% attendent d'avoir une nouvelle prescription de leur médecin. Un Français sur cinq (19%) gardent leurs médicaments "sans jamais les réutiliser", alors que 17% les jettent à la fin du traitement. Enfin, un petit groupe (6%) de personnes finit la boîte, même si cela doit conduire à dépasser le traitement prescrit.

Les Français qui vont systématiquement jusqu'au bout de leurs traitements sont plus souvent enclins à ramener les médicaments à la pharmacie (ou les donner à une association humanitaire), et, dans une moindre mesure, à les conserver et à les réutiliser en fonction d'une nouvelle prescription. Logiquement, ils sont aussi plus nombreux à finir la boîte, quand bien même le traitement ne le prévoit pas.

---

<sup>2</sup> Voir "Prescription pharmaceutique et comportement du patient", CREDOC, Avril 1993.

Les Français qui ne vont pas toujours au bout du traitement sont relativement plus nombreux à conserver leurs médicaments, soit en les réutilisant sans prescription médicale, soit sans jamais les réutiliser.

**Tableau 5**  
**Quand, à l'issue de votre traitement, il vous reste encore quelques médicaments,**  
**qu'en faites-vous le plus souvent ?**

	Ensemble des Français	En %	
		Dont : Va toujours au bout du traitement	Ne va pas toujours au bout du traitement
Vous les ramenez à la pharmacie ou vous les donnez à une association humanitaire .....	31,1	33,7	26,7
Vous les conservez et, en général, vous les réutilisez.....	27,4	25,3	31,0
<i>Dont : vous les réutilisez sans prescription médicale .....</i>	17,8	14,1	24,3
<i>vous les réutilisez après une nouvelle prescription....</i>	9,4	11,0	6,5
Vous les conservez, mais sans jamais les réutiliser .....	18,6	16,4	22,5
Vous les jetez .....	17,0	15,8	19,2
Vous continuez d'en prendre jusqu'à ce que la boîte soit finie	5,8	8,6	0,6
Ne sait pas, non réponse .....	0,2	0,2	-
Ensemble de la population.....	100,0	100,0	100,0

Source : CREDOC, fin 1993.

### **Rapporter les médicaments à la pharmacie ou les donner à une association humanitaire : une pratique des femmes retraitées**

Comme pour la question précédente sur l'observance de la médication, l'utilisation des surplus de médicaments est très liée à l'âge (Cf tableau 12 ci-après). Ainsi, rapporter les médicaments à la pharmacie ou les donner à une association humanitaire est surtout le fait des retraités, en particulier des femmes retraitées : 49% d'entre elles adoptent ce comportement (tableau 6). Globalement, les personnes de plus de 60 ans, et dans une moindre mesure les femmes et les non-diplômés, apportent plus facilement leurs médicaments à la pharmacie ou à une association humanitaire.

Tableau 6

Catégories où la part de ceux qui déclarent rapporter leurs médicaments à la pharmacie est élevée

	En %
Est âgé de 60 ans et plus.....	44,1
dont femme âgée de 60 ans et plus.....	49,2
Appartient à la PCS : retraité .....	44,1
Femme.....	34,9
Ne dispose d'aucun diplôme ou seulement du CEP .....	35,5
<b>Ensemble de la population.....</b>	<b>31,1</b>

Source : CREDOC, fin 1993.

Exemple de lecture : 44,1 % des personnes âgées de 60 ans et plus déclarent rapporter leurs médicaments restants à la pharmacie ou les donner à une association humanitaire, contre 31,1 % en moyenne pour l'ensemble de la population.

### Jeter les médicaments : un profil peu marqué

Jeter les médicaments restants est une pratique opérée par un groupe d'individus difficile à caractériser d'un point de vue socio-démographique : ce comportement se retrouve donc en proportion à peu près équivalente dans tous les groupes de population. Cependant, deux catégories semblent se distinguer : les actifs qui vivent seuls (sans conjoint), les inactifs mariés à un conjoint actif (tableau 7).

Tableau 7

Catégories où la part de ceux qui jettent leurs médicaments est élevée

	En %
Est actif et n'a pas de conjoint.....	23,4
Est inactif et marié à un conjoint actif.....	22,4
<b>Ensemble de la population.....</b>	<b>17,0</b>

Source : CREDOC, fin 1993.

Exemple de lecture : 23,4 % des personnes actives sans conjoint déclarent jeter leurs médicaments, contre 17 % de l'ensemble des Français.

### Conserver les médicaments et les réutiliser après une nouvelle prescription médicale : plus souvent une habitude des familles nombreuses

Deux groupes de population semblent adopter, plus souvent qu'en moyenne, l'habitude de conserver ses médicaments et de les réutiliser après une nouvelle prescription : les personnes de moins de 40 ans vivant en couple avec des enfants (en

particulier quand la famille est nombreuse, c'est-à-dire qu'elle comporte trois enfants et plus) ; les hommes de moins de 25 ans (16% d'entre eux ont pris cette habitude).

**Tableau 8**  
Catégories où la part de ceux qui réutilisent leurs médicaments après une nouvelle prescription est élevée

	En %
Nombre d'enfants de moins de 16 ans au foyer : trois & plus.	17,1
Homme de moins de 25 ans .....	16,0
A moins de 40 ans, vit en couple avec des enfants .....	12,8
<b>Ensemble de la population.....</b>	<b>9,4</b>

Source : CREDOC, fin 1993.

Exemple de lecture : 16% des hommes de moins de 25 ans réutilisent leurs médicaments après une nouvelle prescription, contre 9,4% en moyenne.

### Finir la boîte : un procédé utilisé par certains hommes retraités

Finir la boîte alors même que la médication ne le prévoit pas est une habitude qu'adoptent certains retraités, en particulier les hommes. Ainsi, 15% des hommes de 60 ans et plus continuent, le plus souvent, de prendre des médicaments jusqu'à ce que la boîte soit finie. Globalement, ce procédé est plutôt le fait des non-diplômés et de ceux qui attribuent aux médecins l'entière responsabilité du maintien en bonne santé.

**Tableau 9**  
Catégories où la part de ceux qui déclarent continuer à prendre les médicaments jusqu'à la fin de la boîte est élevée

	En %
Est âgé de 60 ans et plus.....	13,1
dont homme de 60 ans et plus .....	14,6
Appartient à la PCS : retraité .....	12,4
Ne dispose d'aucun diplôme ou seulement du CEP .....	11,4
Est tout à fait d'accord avec l'idée selon laquelle le maintien en bonne santé est l'affaire des médecins .....	9,8
<b>Ensemble de la population.....</b>	<b>5,8</b>

Source : CREDOC, fin 1993.

Exemple de lecture : 13,1% des personnes âgées de 60 ans et plus déclarent continuer à prendre les médicaments jusqu'à la fin de la boîte, contre 5,8% dans l'ensemble de la population.

### Conserver les médicaments sans jamais les réutiliser : plutôt une habitude des hommes jeunes

Les plus jeunes conservent, stockent sans se préoccuper ensuite de ce qu'ils ont en réserve dans leur pharmacie personnelle : 32 % des moins de 25 ans sont dans ce cas, et, en particulier, 35 % des hommes de cet âge (tableau 10). Cette proportion est même encore plus forte chez les célibataires qui vivent chez leurs parents, ces derniers étant justement là pour s'occuper de la "gestion des stocks".

**Tableau 10**  
Catégories où la part de ceux qui déclarent conserver leurs médicaments sans les réutiliser est élevée

	En %
Célibataire vivant chez ses parents .....	38,0
Appartient à la PCS : étudiant .....	34,2
Est âgé de moins de 25 ans .....	31,5
dont : homme de moins de 25 ans .....	35,1
Ensemble de la population .....	18,6

Source : CREDOC, fin 1993.

Exemple de lecture : 38 % des célibataires vivant chez leurs parents déclarent conserver leurs médicaments sans les réutiliser, contre 18,6 % des Français en moyenne.

### Conserver les médicaments et les réutiliser sans prescription médicale : des initiatives que se permettent plus facilement les diplômés

Conserver les médicaments et les réutiliser sans prescription médicale est aussi une pratique plus fréquente chez les jeunes (les moins de 25 ans), en particulier lorsqu'ils vivent chez leurs parents, mais ceux-ci sont rejoints par leurs aînés masculins. Globalement les cadres supérieurs, les hommes actifs et les personnes titulaires d'un diplôme élevé (du supérieur ou d'une grande école) "osent" plus facilement réutiliser des médicaments sans prescription médicale.

**Tableau 11**  
**Catégories où la part de ceux qui déclarent réutiliser leurs médicaments sans prescription est élevée**

	En %
Appartient à la PCS : étudiant .....	33,5
Est âgé de moins de 25 ans.....	28,9
Appartient à la PCS : cadre supérieur .....	28,0
Homme de 25 à 39 ans.....	26,9
Célibataire vivant chez ses parents.....	26,7
Homme actif.....	24,1
Est diplômé du supérieur ou d'une grande école.....	24,1
<b>Ensemble de la population.....</b>	<b>17,8</b>

Source : CREDOC, fin 1993.

**Exemple de lecture** : 33,5% des étudiants déclarent réutiliser leurs médicaments sans nouvelle prescription, contre 17,8% dans l'ensemble de la population.

**Tableau 12**  
**L'utilisation des surplus de médicaments selon l'âge**

		En %			
	Ensemble des Français	24 ans et moins	25 à 39 ans	40 à 59 ans	60 ans et plus
Vous les ramenez à la pharmacie ou vous les donnez à une association humanitaire .....	31,1	12,1	27,7	32,5	<b>44,1</b>
Vous les conservez et, en général, vous les réutilisez .....	27,4	<b>41,7</b>	<b>33,1</b>	25,5	14,9
<i>Dont :</i>					
<i>vous les réutilisez sans prescription médicale.....</i>	17,8	<b>28,9</b>	<b>21,8</b>	18,0	6,7
<i>vous les réutilisez après une nouvelle prescription.....</i>	9,4	12,7	11,2	7,1	8,2
Vous les conservez, mais sans jamais les réutiliser.....	18,6	<b>31,5</b>	19,1	17,8	11,8
Vous les jetez.....	17,0	12,6	17,7	19,2	15,7
Vous continuez d'en prendre jusqu'à ce que la boîte soit finie.....	5,8	2,1	2,5	4,8	<b>13,1</b>
Ne sait pas, non réponse.....	0,2	-	-	0,2	0,4
<b>Ensemble de la population .....</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Source : CREDOC, fin 1993.

### Libellé des questions posées

**I3 - Quand un médecin vous prescrit un médicament, allez-vous systématiquement jusqu'au bout du traitement prescrit ?**

1. Oui
2. Non

**I4 - Quand, à l'issue de votre traitement, il vous reste encore quelques médicaments, qu'en faites-vous le plus souvent ?**

*(Présentez la liste - une seule réponse)*

1. Vous continuez d'en prendre jusqu'à ce que la boîte soit finie
2. Vous les conservez, mais sans jamais les réutiliser
3. Vous les conservez et en général vous les réutilisez
4. Vous les jetez
5. Vous les ramenez à la pharmacie ou vous les donnez à une association humanitaire

**I5 - Quand il vous arrive de réutiliser ces médicaments, est-ce plutôt ?**

*(Enumérez - une seule réponse)*

1. En fonction d'une nouvelle prescription de ces médicaments par votre médecin
2. Sans prescription médicale

**Quelques tableaux croisés**

---

 SOMMAIRE DES EDITIONS
 

---

 COMMANDE 1
 

---

TABLEAU 1	EN LIGNE : 235 . I3: Allez-vous systém. jusqu'au bout du traitement prescrit? EN COLONNE : 7 . A1: Sexe de l'enquêté(e) :
TABLEAU 2	EN LIGNE : 235 . I3: Allez-vous systém. jusqu'au bout du traitement prescrit? EN COLONNE : 441 . AGE DE L'ENQUETE(E) EN 4 POSTES
TABLEAU 3	EN LIGNE : 235 . I3: Allez-vous systém. jusqu'au bout du traitement prescrit? EN COLONNE : 438 . PCS EN 9 POSTES
TABLEAU 4	EN LIGNE : 235 . I3: Allez-vous systém. jusqu'au bout du traitement prescrit? EN COLONNE : 508 . diplôme en 4 postes
TABLEAU 5	EN LIGNE : 235 . I3: Allez-vous systém. jusqu'au bout du traitement prescrit? EN COLONNE : 551 . Revenu mensuel global du foyer
TABLEAU 6	EN LIGNE : 235 . I3: Allez-vous systém. jusqu'au bout du traitement prescrit? EN COLONNE : 468 . nombre de personnes vivant dans le logement
TABLEAU 7	EN LIGNE : 550 . Que faites-vous des médicaments à la fin du traitement ? EN COLONNE : 7 . A1: Sexe de l'enquêté(e) :
TABLEAU 8	EN LIGNE : 550 . Que faites-vous des médicaments à la fin du traitement ? EN COLONNE : 441 . AGE DE L'ENQUETE(E) EN 4 POSTES
TABLEAU 9	EN LIGNE : 550 . Que faites-vous des médicaments à la fin du traitement ? EN COLONNE : 438 . PCS EN 9 POSTES
TABLEAU 10	EN LIGNE : 550 . Que faites-vous des médicaments à la fin du traitement ? EN COLONNE : 508 . diplôme en 4 postes
TABLEAU 11	EN LIGNE : 550 . Que faites-vous des médicaments à la fin du traitement ? EN COLONNE : 551 . Revenu mensuel global du foyer
TABLEAU 12	EN LIGNE : 550 . Que faites-vous des médicaments à la fin du traitement ? EN COLONNE : 468 . nombre de personnes vivant dans le logement

TABLEAU 1 EN LIGNE : I3: Allez-vous systém. jusqu'au bout du traitement prescrit? POIDS TOTAL : 2001.  
EN COLONNE : A1: Sexe de l'enquêté(e) :

POIDS % COLONNE	masculin	féminin	ENSEMBLE
oui	585 61.86 45.60	699 66.25 54.40	1284 64.17 100.00
non	359 37.91 50.37	353 33.52 49.63	712 35.59 100.00
nsp, nr	2 .23 46.99	2 .24 53.01	5 .23 100.00
ENSEMBLE	946 100.00 47.30	1055 100.00 52.70	2001 100.00 100.00

CHI2 = 4.20 / 2 DEGRES DE LIBERTE / 2 EFFECTIFS THEORIQUES INFERIEURS A 5 / PROBA ( CHI2 > 4.20 ) = .123 / V.TEST = 1.16

TABLEAU 2 EN LIGNE : I3: Allez-vous systém. jusqu'au bout du traitement prescrit? POIDS TOTAL : 2001.  
EN COLONNE : AGE DE L'ENQUETE(E) EN 4 POSTES

POIDS % COLONNE	24 ET MOINS	25 à 39 ANS	40 à 59 ANS	60 ET PLUS	ENSEMBLE
oui	131 48.60 10.18	356 57.28 27.76	391 64.01 30.46	406 81.37 31.60	1284 64.17 100.00
non	137 51.06 19.28	263 42.34 37.00	219 35.89 30.79	92 18.46 12.93	712 35.59 100.00
nsp, nr	1 .34 19.58	2 .37 49.48	1 .11 13.85	1 .16 17.09	5 .23 100.00
ENSEMBLE	269 100.00 13.44	622 100.00 31.10	611 100.00 30.54	499 100.00 24.92	2001 100.00 100.00

CHI2 = 106.12 / 6 DEGRES DE LIBERTE / 4 EFFECTIFS THEORIQUES INFERIEURS A 5 / PROBA ( CHI2 > 106.12 ) = .000 / V.TEST = 9.23

TABLEAU 3 EN LIGNE : 13: Allez-vous systém. jusqu'au bout du traitement prescrit?  
EN COLONNE : PCS EN 9 POSTES

POIDS TOTAL : 2001.

% COLONNE	POIDS	EXPLOITANT	ART.COMM.	CADRE SUP PR	PROF INTERM.	EMPLOYE	OUVRIER	ETUDIANT
	% LIGNE	AGRICOLE	CHEF ENT	OF. LIB				
oui	31 62.58 2.45	41 48.02 3.18	81 62.79 6.27	142 62.09 11.03	180 55.52 14.04	186 57.09 14.50	60 55.16 4.69	
non	19 37.42 2.64	43 50.32 6.00	48 37.21 6.70	86 37.91 12.14	143 43.99 20.05	140 42.91 19.65	49 44.84 6.87	
nsp, nr	0 .00 .00	1 1.65 29.90	0 .00 .00	0 .00 .00	2 .48 33.43	0 .00 .00	0 .00 .00	
ENSEMBLE	50 100.00 2.51	85 100.00 4.25	128 100.00 6.41	228 100.00 11.40	325 100.00 16.22	326 100.00 16.30	109 100.00 5.45	
% COLONNE	POIDS	RETRAITE	AUTRE	ENSEMBLE				
	% LIGNE		INACTIF					
oui	364 80.23 28.33	199 67.29 15.53	1284 64.17 100.00					
non	89 19.59 12.47	96 32.40 13.48	712 35.59 100.00					
nsp, nr	1 .18 17.09	1 .31 19.58	5 .23 100.00					
ENSEMBLE	453 100.00 22.66	296 100.00 14.81	2001 100.00 100.00					

CHI2 = 93.40 / 16 DEGRES DE LIBERTE / 9 EFFECTIFS THEORIQUES INFERIEURS A 5 / PROBA ( CHI2 > 93.40 ) = .000 / V.TEST = 7.11

TABLEAU 4 EN LIGNE : 13: Allez-vous systém. jusqu'au bout du traitement prescrit?  
EN COLONNE : diplôme en 4 postes

POIDS TOTAL : 2001.

% COLONNE	POIDS	Aucun, cep	BEPC,tech(<b ac)	BAC,tech(niv . bac)	Sup. grdes é coles	ENSEMBLE
	% LIGNE					
oui	422 68.86 32.83	513 61.77 39.94	150 60.28 11.65	200 64.48 15.58	1284 64.17 100.00	
non	189 30.91 26.57	314 37.84 44.12	99 39.72 13.84	110 35.52 15.47	712 35.59 100.00	
nsp, nr	1 .24 30.94	3 .39 69.06	0 .00 .00	0 .00 .00	5 .23 100.00	
ENSEMBLE	612 100.00 30.60	830 100.00 41.49	248 100.00 12.40	310 100.00 15.50	2001 100.00 100.00	

CHI2 = 11.75 / 6 DEGRES DE LIBERTE / 4 EFFECTIFS THEORIQUES INFERIEURS A 5 / PROBA ( CHI2 > 11.75 ) = .068 / V.TEST = 1.49

TABLEAU 5 EN LIGNE : 13: Allez-vous systém. jusqu'au bout du traitement prescrit? POIDS TOTAL : 2001.  
EN COLONNE : Revenu mensuel global du foyer

POIDS % COLONNE	Moins de 6000 F.	6000 à 7999 F.	8000 à 9999 F.	10000 à 11999 F.	12000 à 14999 F.	15000 F. et plus	Non déclaré
oui	235 67.25 18.32	140 61.51 10.88	149 61.44 11.63	140 60.48 10.91	148 59.22 11.52	319 63.82 24.84	153 76.51 11.90
non	113 32.26 15.84	87 38.49 12.28	94 38.56 13.16	90 38.85 12.63	102 40.78 14.30	179 35.90 25.20	47 23.49 6.59
nsp, nr	2 .49 36.67	0 .00 .00	0 .00 .00	2 .68 33.43	0 .00 .00	1 .28 29.90	0 .00 .00
ENSEMBLE	350 100.00 17.48	227 100.00 11.35	243 100.00 12.15	232 100.00 11.57	250 100.00 12.48	500 100.00 24.98	200 100.00 9.98

POIDS % COLONNE	ENSEMBLE
% LIGNE	
oui	1284 64.17 100.00
non	712 35.59 100.00
nsp, nr	5 .23 100.00
ENSEMBLE	2001 100.00 100.00

CHI2 = 25.41 / 12 DEGRES DE LIBERTE / 7 EFFECTIFS THEORIQUES INFERIEURS A 5 / PROBA ( CHI2 > 25.41 ) = .013 / V.TEST = 2.23

TABLEAU 6 EN LIGNE : 13: Allez-vous systém. jusqu'au bout du traitement prescrit? POIDS TOTAL : 2001.  
EN COLONNE : nombre de personnes vivant dans le logement

POIDS % COLONNE	une	deux	trois	quatre	cinq et plus	ENSEMBLE
oui	216 70.85 16.84	397 67.37 30.94	254 62.00 19.75	248 59.96 19.34	169 59.61 13.13	1284 64.17 100.00
non	89 29.15 12.49	192 32.50 26.91	152 37.27 21.41	165 39.82 23.15	114 40.39 16.04	712 35.59 100.00
nsp, nr	0 .00 .00	1 .14 17.09	3 .73 63.34	1 .22 19.58	0 .00 .00	5 .23 100.00
ENSEMBLE	305 100.00 15.25	590 100.00 29.47	409 100.00 20.44	414 100.00 20.70	283 100.00 14.13	2001 100.00 100.00

CHI2 = 20.67 / 8 DEGRES DE LIBERTE / 5 EFFECTIFS THEORIQUES INFERIEURS A 5 / PROBA ( CHI2 > 20.67 ) = .008 / V.TEST = 2.40

TABLEAU 7 EN LIGNE : Que faites-vous des médicaments à la fin du traitement ? POIDS TOTAL : 2001.  
 EN COLONNE : A1: Sexe de l'enquêté(e) :

POIDS % COLONNE % LIGNE	masculin	féminin	ENSEMBLE
Continue à prendre	53 5.65 46.11	62 5.92 53.89	116 5.79 100.00
Conserv. sans utilis	183 19.30 49.17	189 17.91 50.83	372 18.57 100.00
Réutilise sur presc.	85 8.97 45.16	103 9.78 54.84	188 9.39 100.00
Réutilise sans presc	197 20.80 55.18	160 15.16 44.82	357 17.83 100.00
Jette	172 18.14 50.60	168 15.90 49.40	339 16.96 100.00
Rapporte pharmacie	255 26.93 40.92	368 34.89 59.08	623 31.13 100.00
N.s.p. , n.r.	2 .22 30.42	5 .44 69.58	7 .33 100.00
ENSEMBLE	946 100.00 47.30	1055 100.00 52.70	2001 100.00 100.00

CHI2 = 22.23 / 6 DEGRES DE LIBERTE / 2 EFFECTIFS THEORIQUES INFERIEURS A 5 / PROBA ( CHI2 > 22.23 ) = .001 / V.TEST = 3.06

TABLEAU 8 EN LIGNE : Que faites-vous des médicaments à la fin du traitement ?  
 EN COLONNE : AGE DE L'ENQUETE(E) EN 4 POSTES

POIDS TOTAL : 2001.

POIDS % COLONNE % LIGNE	24 ET MOINS	25 à 39 ANS	40 à 59 ANS	60 ET PLUS	ENSEMBLE
Continue à prendre	6 2.14 4.96	15 2.49 13.35	29 4.82 25.40	65 13.08 56.29	116 5.79 100.00
Conserv. sans utilis	85 31.52 22.82	119 19.10 31.99	109 17.83 29.32	59 11.82 15.87	372 18.57 100.00
Réutilise sur presc.	34 12.74 18.24	69 11.17 36.98	43 7.11 23.13	41 8.17 21.66	188 9.39 100.00
Réutilise sans presc	78 28.91 21.80	136 21.78 38.00	110 17.95 30.75	34 6.76 9.45	357 17.83 100.00
Jette	34 12.61 10.00	110 17.70 32.44	117 19.17 34.52	78 15.68 23.04	339 16.96 100.00
Rapporte pharmacie	32 12.07 5.21	172 27.66 27.63	199 32.49 31.88	220 44.06 35.27	623 31.13 100.00
N.s.p. , n.r.	0 .00 .00	1 .11 10.23	4 .63 57.82	2 .43 31.95	7 .33 100.00
ENSEMBLE	269 100.00 13.44	622 100.00 31.10	611 100.00 30.54	499 100.00 24.92	2001 100.00 100.00

CHI2 = 239.31 / 18 DEGRES DE LIBERTE / 4 EFFECTIFS THEORIQUES INFIEURS A 5 / PROBA ( CHI2 > 239.31 ) = .000 / V.TEST = 13.30

TABLEAU 9 EN LIGNE : Que faites-vous des médicaments à la fin du traitement ? POIDS TOTAL : 2001.  
EN COLONNE : PCS EN 9 POSTES

% COLONNE	EXPLOITANT		ART.COMM.		CADRE SUP PR		PROF INTERM.		EMPLOYE		OUVRIER		ETUDIANT	
	% LIGNE	AGRICOLE	CHEF ENT		OF. LIB									
Continue à prendre		2 3.23	3 3.13	8 6.37	7 3.09	8 2.44	12 3.53	4 3.51						
		1.40	2.29	7.04	6.09	6.84	9.93	3.30						
Conserv. sans utilis		9 18.36	21 24.57	25 19.59	46 20.01	59 18.08	71 21.84	37 34.19						
		2.48	5.62	6.76	12.29	15.80	19.17	10.04						
Réutilise sur presc.		5 10.11	6 7.10	15 11.76	16 7.21	42 12.98	21 6.48	11 10.53						
		2.70	3.21	8.02	8.75	22.42	11.24	6.11						
Réutilise sans presc		9 18.69	17 19.55	36 27.95	53 23.12	58 17.81	70 21.60	37 33.50						
		2.63	4.66	10.05	14.79	16.21	19.75	10.24						
Jette		14 28.61	15 17.55	12 9.71	35 15.55	61 18.88	68 20.80	10 9.34						
		4.23	4.39	3.67	10.45	18.06	19.99	3.00						
Rapporte pharmacie		11 21.00	24 28.10	31 23.92	70 30.71	95 29.27	83 25.37	10 8.92						
		1.69	3.83	4.92	11.25	15.26	13.29	1.56						
N.s.p. , n.r.		0 .00	0 .00	1 .70	1 .30	2 .54	1 .38	0 .00						
		.00	.00	13.33	10.23	26.05	18.44	.00						
ENSEMBLE		50 100.00	85 100.00	128 100.00	228 100.00	325 100.00	326 100.00	109 100.00						
		2.51	4.25	6.41	11.40	16.22	16.30	5.45						

% COLONNE	RETRAITE		AUTRE		ENSEMBLE	
	% LIGNE		INACTIF			
Continue à prendre		56 12.41	17 5.70	116 5.79		
		48.53	14.57	100.00		
Conserv. sans utilis		50 11.13	53 17.87	372 18.57		
		13.59	14.25	100.00		
Réutilise sur presc.		37 8.17	34 11.32	188 9.39		
		19.70	17.84	100.00		
Réutilise sans presc		33 7.26	44 14.99	357 17.83		
		9.22	12.45	100.00		
Jette		75 16.45	48 16.30	339 16.96		
		21.98	14.23	100.00		
Rapporte pharmacie		200 44.11	100 33.82	623 31.13		
		32.11	16.09	100.00		
N.s.p. , n.r.		2 .47	0 .00	7 .33		
		31.95	.00	100.00		
ENSEMBLE		453 100.00	296 100.00	2001 100.00		
		22.66	14.81	100.00		

CHI2 = 220.26 / 48 DEGRES DE LIBERTE / 12 EFFECTIFS THEORIQUES INFERIEURS A 5 / PROBA ( CHI2 > 220.26 ) = .000 / V.TEST = 10.01

TABLEAU 10 EN LIGNE : Que faites-vous des médicaments à la fin du traitement ?  
 EN COLONNE : diplôme en 4 postes

POIDS TOTAL : 2001.

POIDS % COLONNE % LIGNE	Aucun, cep	BEPC,tech(<b ac)	BAC,tech(niv . bac)	Sup. grdes é coles	ENSEMBLE
Continue à prendre	70 11.43 60.39	29 3.52 25.19	4 1.78 3.81	12 3.97 10.62	116 5.79 100.00
Conserv. sans utilis	100 16.26 26.80	153 18.45 41.24	55 22.11 14.77	64 20.59 17.19	372 18.57 100.00
Réutilise sur presc.	52 8.53 27.80	71 8.53 37.68	29 11.77 15.53	36 11.50 18.99	188 9.39 100.00
Réutilise sans presc	73 11.93 20.48	161 19.40 45.15	48 19.24 13.38	75 24.13 20.99	357 17.83 100.00
Jette	98 15.97 28.81	157 18.88 46.19	50 20.23 14.79	35 11.17 10.21	339 16.96 100.00
Rapporte pharmacie	218 35.52 34.92	256 30.87 41.15	62 24.88 9.91	87 28.13 14.01	623 31.13 100.00
N.s.p. , n.r.	2 .35 31.95	3 .36 44.49	0 .00 .00	2 .51 23.56	7 .33 100.00
ENSEMBLE	612 100.00 30.60	830 100.00 41.49	248 100.00 12.40	310 100.00 15.50	2001 100.00 100.00

CHI2 = 97.06 / 18 DEGRES DE LIBERTE / 4 EFFECTIFS THEORIQUES INFERIEURS A 5 / PROBA ( CHI2 > 97.06 ) = .000 / V.TEST = 7.07

TABLEAU 11 EN LIGNE : Que faites-vous des médicaments à la fin du traitement ? POIDS TOTAL : 2001.  
EN COLONNE : Revenu mensuel global du foyer

% COLONNE	POIDS	Moins de 6000	6000 à 7999	8000 à 9999	10000 à 11999	12000 à 14999	15000 F. et	Non déclaré
	% LIGNE	F.	F.	F.	F.	F.	plus	
Continue à prendre		34	18	17	10	7	15	16
		9.67	7.81	6.87	4.13	2.61	3.04	8.21
Conserv. sans utilis		58	39	49	37	48	101	40
		16.66	17.06	20.27	15.93	19.14	20.18	19.86
Réutilise sur presc.		32	19	19	23	23	55	16
		9.23	8.22	7.96	10.12	9.31	10.96	8.09
Réutilise sans presc		54	37	42	49	39	96	39
		15.48	16.41	17.08	21.31	15.53	19.29	19.63
Jette		56	37	41	42	45	80	39
		15.91	16.37	17.04	18.01	17.99	15.92	19.47
Rapporte pharmacie		114	77	74	71	87	151	49
		32.47	33.76	30.50	30.50	34.90	30.25	24.74
N.s.p. , n.r.		2	1	1	0	1	2	0
		.58	.38	.28	.00	.54	.36	.00
ENSEMBLE		350	227	243	232	250	500	200
		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

% COLONNE	POIDS	ENSEMBLE
% LIGNE		
Continue à prendre		116
		5.79
Conserv. sans utilis		372
		18.57
Réutilise sur presc.		188
		9.39
Réutilise sans presc		357
		17.83
Jette		339
		16.96
Rapporte pharmacie		623
		31.13
N.s.p. , n.r.		7
		.33
ENSEMBLE		2001
		100.00

CHI2 = 44.45 / 36 DEGRES DE LIBERTE / 7 EFFECTIFS THEORIQUES INFERIEURS A 5 / PROBA ( CHI2 > 44.45 ) = .158 / V.TEST = 1.00

TABLEAU 12 EN LIGNE : Que faites-vous des médicaments à la fin du traitement ? POIDS TOTAL : 2001.  
 EN COLONNE : nombre de personnes vivant dans le logement

POIDS % COLONNE % LIGNE	une	deux	trois	quatre	cinq et plus	ENSEMBLE
	Continue à prendre	35 11.51 30.32	43 7.27 37.01	18 4.34 15.31	13 3.03 10.83	8 2.68 6.53
Conserv. sans utilis	45 14.65 12.04	107 18.18 28.86	84 20.43 22.49	82 19.70 21.96	54 19.25 14.66	372 18.57 100.00
Réutilise sur presc.	21 7.01 11.39	47 7.98 25.03	42 10.17 22.14	41 9.88 21.78	37 13.07 19.67	188 9.39 100.00
Réutilise sans presc	46 15.12 12.94	90 15.29 25.29	80 19.55 22.42	95 22.88 26.56	46 16.13 12.79	357 17.83 100.00
Jette	53 17.20 15.47	98 16.58 28.80	68 16.51 19.89	63 15.11 18.44	59 20.87 17.39	339 16.96 100.00
Rapporte pharmacie	105 34.28 16.80	203 34.34 32.51	117 28.58 18.77	121 29.10 19.35	78 27.68 12.57	623 31.13 100.00
N.s.p. , n.r.	1 .22 10.23	2 .36 31.95	2 .43 26.05	1 .30 18.44	1 .32 13.33	7 .33 100.00
ENSEMBLE	305 100.00 15.25	590 100.00 29.47	409 100.00 20.44	414 100.00 20.70	283 100.00 14.13	2001 100.00 100.00

CHI2 = 62.00 / 24 DEGRES DE LIBERTE / 5 EFFECTIFS THEORIQUE INFERIEURS A 5 / PROBA ( CHI2 > 62.00 ) = .000 / V.TEST = 3.99

